



GEE!TEST

тест по
Инфекционным болезням

by oldkyx



Тест по Инфекционным болезням

система подготовки к тестам Gee Test

oldkyx.com

Список вопросов по Инфекционным болезням

1. Для холеры характерно сочетание симптомов:

- 1) [+] обильный водянистый стул без запаха, отсутствие болей в животе, тошноты;
 - 2) [-] тошнота, рвота;
 - 3) [-] водянистый зловонный стул;
 - 4) [-] жидкий зеленоватой окраски стул, диффузные боли в животе.
-

2. Генерализованную форму сальмонеллеза от локализованной отличают симптомы:

- 1) [-] рвота;
 - 2) [-] боли в животе;
 - 3) [-] жидкий стул;
 - 4) [+] гепатоспленомегалия.
-

3. Для гастроинтестинальной формы иерсиниоза характерны симптомы:

- 1) [-] жидкий стул, боли в левой подвздошной области;
 - 2) [-] жидкий стул без болей в животе;
 - 3) [+] жидкий стул, боли в правой подвздошной области;
 - 4) [-] жидкий стул, боли в желудке.
-

4. Укажите, какие варианты продромального периода встречаются при гепатите В:

- 1) [-] гриппоподобный;

- 2) [-] диспепсический;
 - 3) [-] артралгический;
 - 4) [-] астено-вегетативный;
 - 5) [+] все вышеперечисленное.
-

5. Укажите причину кишечного кровотечения при брюшном тифе:

- 1) [-] интоксикация;
 - 2) [-] бактериемия;
 - 3) [+] язвенное поражение лимфоидных образований подвздошной кишки;
 - 4) [-] язвенное поражение двенадцатиперстной кишки.
-

6. Цитолиз печеночных клеток при вирусных гепатитах отражают следующие биохимические тесты:

- 1) [-] уровень холестерина;
 - 2) [-] уровень общего белка и белковые фракции крови;
 - 3) [+] уровень аланинаминотрансферазы и аспарагинаминотрансферазы;
 - 4) [-] тимоловая проба.
-

7. Какие ферменты отражают холестаза при вирусных гепатитах?

- 1) [-] АлАт;
 - 2) [-] АсАт;
 - 3) [-] циклический аминоксфат;
 - 4) [+] щелочная фосфатаза.
-

8. Какое звено патогенеза определяет тяжесть

течения холеры?

- 1) [-] интоксикация;
 - 2) [+] изотоническая дегидратация;
 - 3) [-] инвазия возбудителя в слизистую оболочку кишечника;
 - 4) [-] генерализация инфекционного процесса.
-

9. Какие серологические маркеры характерны для гепатита А в остром периоде болезни?

- 1) [-] HbsAg;
 - 2) [-] anti-HB cor IgM;
 - 3) [+] anti-HAV IgM;
 - 4) [-] anti-HCV IgM.
-

10. Какой из серологических маркеров не характерен для гепатита В?

- 1) [-] HbsAg;
 - 2) [-] anti-HBcor IgM;
 - 3) [+] anti-HAV IgM;
 - 4) [-] anti-HBe IgM.
-

11. Сочетание каких симптомов характерно для острой формы амебиаза?

- 1) [-] боли в правой подвздошной области, жидкий стул;
 - 2) [+] боли в правой подвздошной области, стул по типу «малинового желе»;
 - 3) [-] рвота, отсутствие болей в животе;
 - 4) [-] высокая температура, жидкий с прожилками крови стул.
-

12. Какой симптом не характерен для

лептоспироза?

- 1) [-] интоксикация;
 - 2) [-] интенсивные миалгии;
 - 3) [-] поражение почек;
 - 4) [+] обильный частый водянистый стул.
-

13. Какой симптом не характерен для брюшного тифа?

- 1) [-] адинамия;
 - 2) [-] дикротия пульса;
 - 3) [+] эйфория;
 - 4) [-] розеолезная сыпь;
 - 5) [-] гепатоспленомегалия.
-

14. Укажите симптом, не являющийся признаком обезвоживания:

- 1) [-] гипотермия;
 - 2) [-] генерализованные судороги;
 - 3) [+] гипертермия;
 - 4) [-] анурия;
 - 5) [-] отсутствие периферического пульса.
-

15. Сочетание каких симптомов характерно для ботулизма?

- 1) [-] высокая температура, частый жидкий стул;
- 2) [-] высокая температура, нарушение сознания;
- 3) [+] нарушение зрения, глотания;
- 4) [-] судороги мышц, жидкий стул.

16. Какой симптом не характерен для острой печеночной недостаточности?

- 1) [+] увеличение размеров печени;
- 2) [-] тахикардия;
- 3) [-] сокращение размеров печени;
- 4) [-] энцефалопатия;
- 5) [-] геморрагии.

17. Какой из антибактериальных препаратов не назначают для лечения генерализованной формы сальмонеллеза?

- 1) [+] фуразолидон;
- 2) [-] ампициллин;
- 3) [-] левомецетин;
- 4) [-] ципрофлоксацин.

18. Какой процент потери массы тела при алгидной форме холеры?

- 1) [-] 3%;
- 2) [-] 6%;
- 3) [-] 8%;
- 4) [+] 10% и выше.

19. Укажите характерные изменения в периферической крови при брюшном тифе:

- 1) [-] нейтрофильный лейкоцитоз;
- 2) [+] лейкопения с относительным лимфоцитозом;
- 3) [-] лейкоцитоз с лимфоцитозом;
- 4) [-] лейкоцитоз с эозинофилией.

20. Укажите препарат, используемый для лечения больного холерой III степени обезвоживания:

- 1) [-] регидрон;
 - 2) [-] цитроглюкосалан;
 - 3) [-] 5% раствор глюкозы;
 - 4) [-] физиологический раствор;
 - 5) [+] хлосоль.
-

21. Укажите звено патогенеза, отличающее генерализованную форму сальмонеллеза от гастроинтестинальной:

- 1) [-] проникновение сальмонелл в слизистую оболочку тонкого кишечника;
 - 2) [-] интоксикация;
 - 3) [+] бактериемия;
 - 4) [-] паренхиматозная диффузия возбудителя.
-

22. Какие симптомы не характерны для энтеробиоза?

- 1) [-] зуд и жжение в области ануса;
 - 2) [-] раздражительность;
 - 3) [-] плохой сон;
 - 4) [+] гепатоспленомегалия.
-

23. Какой симптом не характерен для лептоспироза?

- 1) [-] высокая температура;
- 2) [-] миалгия;

3) [+] диарея;

4) [-] гиперемия лица, склерит.

24. В каком биологическом субстрате от больного можно обнаружить возбудителя холеры?

1) [-] кровь;

2) [-] моча;

3) [+] кал;

4) [-] слюна.

25. Какой симптом не характерен для брюшного тифа?

1) [-] бледность кожных покровов;

2) [-] розеолезная экзантема;

3) [-] гепатоспленомегалия;

4) [+] тахикардия.

26. Какие лабораторные данные не характерны для декомпенсированного обезвоживания при холере?

1) [+] увеличение ОЦК;

2) [-] ацидоз;

3) [-] гипокалиемия;

4) [-] гипохлоремия.

27. Какой симптом не характерен для трихинеллеза?

1) [+] кашель;

2) [-] лихорадка;

3) [-] отек лица;

4) [-] миалгии.

28. Укажите патогенетический механизм развития диареи при холере:

1) [-] проникновение вибриона в энтероциты;

2) [-] слущивание эпителия тонкой кишки;

3) [-] поражение вегетативной иннервации тонкой кишки;

4) [+] воздействие токсических субстанций на ферментные системы энтероцитов.

29. Укажите первичную локализацию патологического процесса в кишечнике при амебиазе:

1) [-] прямая кишка;

2) [-] сигмовидная кишка;

3) [-] двенадцатиперстная кишка;

4) [+] слепая и восходящий отдел толстой кишки.

30. Укажите характер стула при колитическом варианте дизентерии:

1) [-] обильный водянистый;

2) [-] обильный типа «мясных помоев»;

3) [-] типа «малинового желе»;

4) [+] скудный со слизью и прожилками крови.

31. Укажите, какие отделы нервной системы поражаются при ботулизме:

1) [-] кора головного мозга;

2) [+] двигательные ядра продолговатого мозга;

3) [-] периферические нервы;

4) [-] ганглии.

32. Укажите характер стула при холере:

1) [-] обильный, водянистый, зловонный;

2) [+] обильный, водянистый, без калового запаха и окраски;

3) [-] обильный, водянистый, зеленоватой окраски;

4) [-] водянистый, с примесью крови.

33. Какое сочетание синдромов обуславливает тяжесть течения сальмонеллеза?

1) [-] изотоническое обезвоживание;

2) [-] интоксикация;

3) [+] дегидратация в сочетании с интоксикацией.

34. Какие клинические симптомы характерны для гастроинтестинальной формы сальмонеллеза?

1) [+] тошнота, рвота, жидкий водянистый стул зеленоватого цвета, диффузные боли в животе, высокая температура;

2) [-] рвота без тошноты, без болей в животе, нормальная температура;

3) [-] схваткообразные боли в животе, скудный стул, высокая температура;

4) [-] обильный водянистый стул типа «рисового отвара», без болей в животе, нормальная температура.

35. Укажите сроки первичного появления сыпи при брюшном тифе:

- 1) [-] 1-3 день болезни;
 - 2) [-] 4-7 день болезни;
 - 3) [+] 8-10 день болезни;
 - 4) [-] после 14 дня болезни.
-

36. Укажите типичные изменения уровня билирубина и его фракций при вирусных гепатитах:

- 1) [-] повышение связанной фракции;
 - 2) [-] повышение связанной и свободной фракций в одинаковой мере;
 - 3) [-] повышение свободной фракции;
 - 4) [+] повышение связанной фракции при умеренном повышении свободного билирубина.
-

37. Укажите антибактериальный препарат, используемый для лечения иерсиниоза генерализованной формы:

- 1) [+] аминогликозиды;
 - 2) [-] нитрофураны;
 - 3) [-] сульфаниламиды;
 - 4) [-] макролиды.
-

38. Укажите препарат, используемый для лечения дизентерии колитического варианта тяжелого течения:

- 1) [-] пенициллин;
- 2) [-] фталазол;
- 3) [-] эритромицин;

4) [+] ципрофлоксацин.

39. Укажите причину цитолиза печеночных клеток при вирусном гепатите В:

- 1) [-] непосредственное воздействие вируса на гепатоциты;
 - 2) [+] иммунный ответ на вирусные антигены и аутоантигены;
 - 3) [-] поражение желчных ходов.
-

40. Укажите длительность инкубационного периода при брюшном тифе:

- 1) [-] несколько часов;
 - 2) [-] одни сутки;
 - 3) [-] 2-3 суток;
 - 4) [+] 7-28 дней.
-

41. Укажите препараты для лечения больных холерой I степени обезвоживания:

- 1) [+] трисоль;
 - 2) [-] дисоль;
 - 3) [-] хлосоль;
 - 4) [-] цитраглюкосолан.
-

42. Какие биологические субстраты используются для лабораторного подтверждения диагноза малярии?

- 1) [+] кровь;
- 2) [-] кал;
- 3) [-] моча;
- 4) [-] желчь.

43. В каком биологическом субстрате чаще обнаруживаются возбудители в первую неделю брюшного тифа?

- 1) [+] кровь;
 - 2) [-] кал;
 - 3) [-] моча;
 - 4) [-] желчь.
-

44. Укажите один из механизмов диарейного синдрома, характерный для всех острых кишечных диарейных заболеваний:

- 1) [-] инвазия возбудителя в энтероциты;
 - 2) [-] внедрение возбудителя в кровь;
 - 3) [+] воздействие токсинов на аденилатциклазную систему;
 - 4) [-] внедрение возбудителя в подслизистый слой кишечника.
-

45. Укажите отделы кишечника, наиболее часто поражающиеся при иерсиниозе:

- 1) [-] двенадцатиперстная кишка;
 - 2) [-] тощая кишка;
 - 3) [+] подвздошная кишка;
 - 4) [-] толстая кишка.
-

46. Укажите, какой биологический субстрат используется при сальмонеллезе гастроинтестинальной формы для подтверждения диагноза:

- 1) [-] кровь;

- 2) [+] кал;
- 3) [-] моча;
- 4) [-] желчь.

47. Какое сочетание симптомов характерно для сальмонеллеза?

- 1) [+] высокая температура, диффузные боли в животе, водянистый обильный стул;
- 2) [-] высокая температура, боли в правой подвздошной области, кашицеобразный стул;
- 3) [-] высокая температура, боли в левой подвздошной области, кашицеобразный стул;
- 4) [-] высокая температура, кашицеобразный стул без болей в животе.

48. Укажите этиотропный препарат для лечения больных гриппом:

- 1) [-] бисептол;
- 2) [+] ремантадин;
- 3) [-] эритромицин;
- 4) [-] пенициллин.

49. Укажите биохимический тест для ранней диагностики вирусных гепатитов:

- 1) [-] белковые фракции крови;
- 2) [-] протромбиновый индекс;
- 3) [+] АлАт;
- 4) [-] уровень холестерина.

50. Укажите симптом, характерный для

кишечного кровотечения при брюшном тифе:

- 1) [-] боли в животе;
- 2) [-] положительный симптом Щеткина;
- 3) [+] тахикардия, падение АД.

51. Какой симптом брюшного тифа отсутствует на первой неделе болезни?

- 1) [-] высокая температура;
- 2) [-] головная боль;
- 3) [+] розеолезная сыпь;
- 4) [-] слабость.

52. Укажите препарат для лечения больных пищевой токсикоинфекцией II степени обезвоживания:

- 1) [-] тетрациклин;
- 2) [-] фторхинолоны;
- 3) [-] физиологический раствор;
- 4) [+] цитроглюкосолан.

53. Сочетание каких симптомов характерно для гриппа?

- 1) [+] высокая температура, головная боль, миалгии, трахеит, непродуктивный насморк;
- 2) [-] субфебрильная температура, ларингит, ринит;
- 3) [-] высокая температура, увеличение миндалин, лимфатических узлов, фарингит.

54. Какой симптом не характерен для аденовирусной инфекции?

- 1) [-] высокая температура;
 - 2) [-] фарингит;
 - 3) [-] ринит;
 - 4) [-] лимфаденопатия;
 - 5) [+] артриты.
-

55. При каком остром респираторном вирусном заболевании назначается ремантадин?

- 1) [+] грипп;
 - 2) [-] парагрипп;
 - 3) [-] риновирусная инфекция;
 - 4) [-] аденовирусная инфекция.
-

56. Какие изменения периферической крови характерны для инфекционного мононуклеоза?

- 1) [-] нейтрофильный лейкоцитоз;
 - 2) [-] лейкопения с относительным лимфоцитозом;
 - 3) [+] лейкоцитоз, лимфоцитоз, моноцитоз, атипичные мононуклеары;
 - 4) [-] лейкопения, лимфоцитоз, моноцитоз.
-

57. Достоверным критерием менингококкового менингита являются изменения в ликворе:

- 1) [-] плеоцитоз;
 - 2) [-] снижение сахара;
 - 3) [-] лимфоцитарный плеоцитоз;
 - 4) [+] обнаружение возбудителя.
-

58. Укажите характерную сыпь при менингококцемии:

- 1) [-] пятнистая;
 - 2) [-] нодозная;
 - 3) [-] папулезная;
 - 4) [+] геморрагическая с некрозом.
-

59. Какая суточная доза пенициллина верна для лечения менингококкового менингита средней тяжести, вес больного 80 кг?

- 1) [-] 2 млн ЕД;
 - 2) [-] 6 млн ЕД;
 - 3) [-] 8 млн ЕД;
 - 4) [+] 24 млн ЕД.
-

60. Для какого острого респираторного вирусного заболевания характерен трахеит?

- 1) [+] грипп;
 - 2) [-] парагрипп;
 - 3) [-] риновирусная инфекция;
 - 4) [-] аденовирусная инфекция.
-

61. Для какого острого респираторного вирусного заболевания характерно осложнение «ложный круп»?

- 1) [-] грипп;
 - 2) [+] парагрипп;
 - 3) [-] риновирусная инфекция;
 - 4) [-] аденовирусная инфекция.
-

62. Какой симптом не характерен для парагриппа?

- 1) [+] лимфаденопатия;
 - 2) [-] кашель;
 - 3) [-] насморк;
 - 4) [-] осиплость голоса;
 - 5) [-] повышение температуры.
-

63. Какой вирусный гепатит чаще сопровождается хронизацией процесса с исходом в цирроз?

- 1) [-] вирусный гепатит А;
 - 2) [-] вирусный гепатит В;
 - 3) [+] вирусный гепатит С;
 - 4) [-] вирусный гепатит Е.
-

64. Наиболее частый исход гепатита А:

- 1) [-] летальный;
 - 2) [+] выздоровление;
 - 3) [-] острая печеночная недостаточность;
 - 4) [-] цирроз печени.
-

65. Какое сочетание симптомов характерно для колитического варианта дизентерии?

- 1) [-] высокая температура, тошнота, боли в эпигастрии;
- 2) [+] высокая температура, боли в левой подвздошной области, скудный стул с примесью слизи и крови;
- 3) [-] нормальная температура, боли в правой подвздошной области, жидкий стул с кровью;
- 4) [-] высокая температура, диффузные боли в животе, обильный водянистый стул.

66. Какой материал используется для бактериологического подтверждения дизентерии?

- 1) [-] кровь;
 - 2) [-] моча;
 - 3) [+] кал;
 - 4) [-] желчь.
-

67. Какой препарат является решающим в лечении ботулизма?

- 1) [-] пенициллин;
 - 2) [-] анатоксин;
 - 3) [+] антитоксическая сыворотка;
 - 4) [-] реополиглюкин.
-

68. Какой тип температуры характерен для малярии?

- 1) [-] постоянный;
 - 2) [-] волнообразный;
 - 3) [-] ремитирующий;
 - 4) [+] интермиттирующий.
-

69. Длительность эритроцитарной шизогонии при трехдневной малярии:

- 1) [-] 24 ч;
- 2) [+] 48 ч;
- 3) [-] 72 ч;
- 4) [-] 36 ч.

70. Сочетание каких симптомов характерно для инфекционного мононуклеоза?

- 1) [-] лихорадка, лимфаденопатия, боли в животе;
- 2) [-] лихорадка, ангина, лимфаденопатия, диарея;
- 3) [-] лихорадка, тошнота, рвота;
- 4) **[+] лихорадка ангина, лимфаденопатия, гепатоспленомегалия.**

71. Какое сочетание симптомов характерно для начала менингококкового менингита?

- 1) [-] постепенное начало, головная боль, рвота, жидкий стул;
- 2) **[+] быстрое повышение температуры, головная боль, рвота без болей в животе;**
- 3) [-] высокая температура, рвота, боли в животе;
- 4) [-] высокая температура, головная боль, нарушение зрения.

72. Укажите симптом, характерный для вирусного ринита:

- 1) **[+] обильные водянистые выделения из носа, чихание;**
- 2) [-] пленки в носу;
- 3) [-] сукровичные выделения из носа;
- 4) [-] гипертермия.

73. Укажите препарат, который предпочтителен для лечения молниеносной формы менингококцемии:

- 1) [-] пенициллин;

2) [+] левомецетин;

3) [-] ампициллин;

4) [-] ампиокс.

74. Какой симптом не типичен для начальной фазы ГЛПС?

1) [-] гиперемия и одутловатость лица;

2) [-] инъекция сосудов склер и конъюнктив;

3) [+] бледность кожных покровов;

4) [-] высокая температура;

5) [-] нарушение зрения.

75. Какое осложнение может привести к летальному исходу при тропической малярии?

1) [+] кома;

2) [-] дегидратационный шок;

3) [-] кровотечение;

4) [-] перитонит.

76. Какой препарат действует на эритроцитарные формы плазмодия?

1) [+] делагил;

2) [-] примахин;

3) [-] метрагил;

4) [-] хиноцид.

77. Какое осложнение может привести к летальному исходу при ГЛПС?

1) [-] кома;

2) [-] гиповолемиа;

3) [+] острая почечная недостаточность.

78. Какой препарат наиболее эффективен при лечении сыпного тифа?

1) [+] тетрациклин;

2) [-] пенициллин;

3) [-] левомицетин;

4) [-] эритромицин.

79. Укажите наиболее частое сочетание симптомов при сыпном тифе:

1) [-] высокая температура 4 недели, головная боль, гепатоспленомегалия;

2) [+] высокая температура до 14 дней, головная боль, гиперемия лица, розеолезно-петехиальная сыпь;

3) [-] высокая волнообразная лихорадка, гепатоспленомегалия, боли в суставах;

4) [-] высокая температура до 3-4-х недель, бледность кожных покровов, гепатоспленомегалия, розеолезная сыпь.

80. Какой лабораторный метод используется для подтверждения диагноза при сыпном тифе?

1) [-] посев крови;

2) [+] серологические исследования для обнаружения специфических антител;

3) [-] микроскопия мазка крови;

4) [-] посев кала.

81. Укажите, что характерно для бубона при чуме:

- 1) [-] гиперемия кожи, безболезненность;
 - 2) [+] гиперемия кожи, периаденит, болезненность;
 - 3) [-] четкая конфигурация лимфоузлов, безболезненность;
 - 4) [-] кожа обычной окраски, безболезненность.
-

82. Сочетание, каких симптомов характерно для бубонной формы туляремии?

- 1) [+] лихорадка, бубон малоболезненный, гепатоспленомегалия;
 - 2) [-] лихорадка, гепатоспленомегалия, пневмония;
 - 3) [-] лихорадка, резко болезненный бубон, гепатоспленомегалия;
 - 4) [-] лихорадка, карбункул, увеличение лимфатических узлов.
-

83. Какой антибактериальный препарат используется для лечения туляремии?

- 1) [-] пенициллин;
 - 2) [-] эритромицин;
 - 3) [+] тетрациклин;
 - 4) [-] цефазолин.
-

84. Какая клиническая форма туляремии возникает при воздушно-пылевом пути заражения?

- 1) [-] кожно-бубонная;
- 2) [-] бубонная;
- 3) [-] абдоминальная;
- 4) [+] легочная.

85. С каким возбудителем ассоциируется тяжелое течение малярии с развитием комы?

- 1) [-] Pl. Vivax;
 - 2) [-] Pl. Ovale;
 - 3) [-] Pl. Malaria;
 - 4) [+] Pl. Falciparum.
-

86. Болезнь Брилля является:

- 1) [-] первичным эпидемическим сыпным тифом;
 - 2) [-] повторным эпидемическим сыпным тифом;
 - 3) [+] рецидивом эпидемического сыпного тифа.
-

87. Какие патологические процессы характерны для ГЛГТС?

- 1) [-] вирусемия, поражение слизистых оболочек дыхательных путей
 - 2) [+] вирусемия, поражение стенки кровеносных сосудов и почек
 - 3) [-] вирусемия, поражение сосудов, желудочно-кишечного тракта
-

88. При какой геморрагической лихорадке развивается острая почечная недостаточность?

- 1) [-] омская;
 - 2) [-] крымская;
 - 3) [+] ГЛПС.
-

89. Укажите сочетание симптомов, характерное для столбняка:

- 1) [-] тризм, обильная саливация;

2) [-] тонические судороги, тризм, нарушение сознания;

3) [+] тризм, тонические судороги конечностей, туловища, ясное сознание;

4) [-] тризм, гидрофобия, параличи мышц конечностей.

90. Что характерно для карбункула, возникающего при сибирской язве?

1) [-] черный безболезненный струп;

2) [-] вал красного цвета вокруг;

3) [-] безболезненный отек тканей вокруг;

4) [+] все вышеперечисленное.

91. Какой антибактериальный препарат используется для лечения сибирской язвы?

1) [+] пенициллин;

2) [-] эритромицин;

3) [-] бисептол;

4) [-] линкомицин.

92. Укажите этиологию пневмонии, наиболее характерную для ВИЧ-инфекции:

1) [-] стафилококковая;

2) [-] пневмококковая;

3) [+] пневмоцистная;

4) [-] вирусная.

93. Сочетание каких симптомов характерно для ранней стадии ВИЧ-инфекции?

1) [+] лихорадка, лимфаденопатия;

2) [-] лихорадка, опухолевые процессы;

3) [-] нормальная температура, лимфаденопатия;

4) [-] все вышеперечисленное.

94. Какие симптомы характерны для ВИЧ-инфекции?

1) [-] лихорадка;

2) [-] лимфаденопатия;

3) [-] диарея, потеря массы тела;

4) [-] эндогенные инфекции, саркома Капоши;

5) [+] все вышеперечисленные.

95. Какой лабораторный тест наиболее достоверно подтверждает диагноз ВИЧ-инфекции?

1) [-] клинический анализ крови;

2) [-] ИФА;

3) [-] соотношение Т-хелперов и Т-супрессоров;

4) [+] иммуноблотинг.

96. К каким субпопуляциям лимфоцитов тропен ВИЧ?

1) [+] Т-хелперы;

2) [-] Т-супрессоры;

3) [-] Т-киллеры.

97. Укажите ведущий симптом столбняка:

1) [-] высокая температура;

2) [+] тонические судороги;

3) [-] параличи;

4) [-] нарушение сознания.

98. Какой препарат используется для профилактики и лечения столбняка?

- 1) [-] антимикробная сыворотка;
 - 2) [+] антитоксическая сыворотка;
 - 3) [-] бактериофаг;
 - 4) [-] нормальная лошадиная сыворотка.
-

99. Какие симптомы характерны для бешенства?

- 1) [-] саливация;
 - 2) [-] гидрофобия;
 - 3) [-] аэрофобия;
 - 4) [+] все выше перечисленные.
-

100. Какие клинические формы имеют место при чуме?

- 1) [-] кожная;
 - 2) [-] бубонная;
 - 3) [-] легочная;
 - 4) [-] септическая;
 - 5) [+] все вышеперечисленные.
-

101. Назовите клинические формы рожи:

- 1) [-] эритематозная;
- 2) [-] эритематозно-геморрагическая;
- 3) [-] буллезная;
- 4) [-] буллезно-геморрагическая;

5) [+] все вышеперечисленные.

102. Какое сочетание симптомов наиболее характерно для орнитоза?

- 1) [-] лихорадка, пневмония;
 - 2) [-] лихорадка, пневмония, лимфаденопатия;
 - 3) [-] лихорадка, гепатоспленомегалия;
 - 4) [+] лихорадка, пневмония, лимфаденопатия, гепатоспленомегалия.
-

103. Укажите препараты противорецидивного действия при малярии:

- 1) [+] примахин;
 - 2) [-] хинин;
 - 3) [-] делагил;
 - 4) [-] нитрофураны.
-

104. Укажите сочетание симптомов, характерных для системного клещевого боррелиоза:

- 1) [-] лихорадка, гепатоспленомегалия, розеолезная сыпь;
 - 2) [+] лихорадка, кольцевидная эритема, кардиальные, неврологические поражения, артриты;
 - 3) [-] лихорадка, артриты, нодозная эритема;
 - 4) [-] лихорадка, поражение сердца и суставов.
-

105. Укажите симптомы, характерные для бруцеллеза:

- 1) [-] волнообразная лихорадка;
- 2) [-] гепатоспленомегалия;

- 3) [-] артриты, миозиты;
- 4) [-] орхиты;
- 5) [+] все вышеперечисленные.