

Green Test



Тест по
Военно-медицинской
подготовке

Тест по Военно-медицинской подготовке

1. Где, как правило, оказывается первая медицинская помощь?
 - 1) В медицинском пункте бригады
 - 2)+ На месте получения ранения (поражения)
 - 3) На медицинском посту роты
2. Что из перечисленного не входит в экипировку санитарного инструктора?
 - 1)+ Сумка медицинская войсковая
 - 2) Лямка медицинская носилочная
 - 3) Сумка медицинская санитаря
3. При оказании первой помощи в первую очередь следует использовать
 - 1)+ Индивидуальный перевязочный пакет раненого
 - 2) Перевязочные средства из СМС
 - 3) Перевязочные средства из СМВ
4. Венозное кровотечение останавливается
 - 1) Жгутом
 - 2)+ Давящей повязкой
 - 3) Пальцевым прижатием
5. При воздействии ударной волны взрыва на значительную поверхность тела человека наступает
 - 1) Ушиб
 - 2) Травматический шок
 - 3)+ Контузия
6. В каком порядке оказывается первая медицинская помощь?
 - 1) В порядке самопомощи
 - 2)+ В порядке само- и взаимопомощи
 - 3) В порядке взаимопомощи
7. Что является целью первой медицинской помощи?
 - 1)+ Предотвращение развития осложнений и гибели раненого
 - 2) Доставка раненого в мед. подразделение
 - 3) Восстановление боеспособности раненого
8. К основным признакам вывиха не относится
 - 1) Невозможность движений в суставе
 - 2) Вынужденное положение конечности из-за сокращения мышц
 - 3)+ Обширная гематома
9. Первым признаком развивающегося отморожения является
 - 1) Потеря чувствительности
 - 2)+ Колющая боль
 - 3) Побеление
10. В чем заключается частичная санитарная обработка при заражении радиоактивными веществами?
 - 1)+ В механическом удалении радиоактивных веществ с открытых участков тела, обмундирования, средств защиты
 - 2) В омывании чистой водой открытых участков тела, обмундирования, средств защиты
 - 3) В отчуждении и изолировании заражённых предметов обмундирования и экипировки

11. Общая слабость, головокружение, головная боль и тошнота могут быть проявлением
- 1) Общего замерзания (охлаждения)
 - 2)+ Общего перегревания (теплового удара)
 - 3) Контузии
12. При поражении кожи ядом растений необходимо
- 1)+ Промыть поражённый участок большим количеством воды, смазать его вазелином
 - 2) Промыть поражённый участок большим количеством воды, запрещено обрабатывать его чем-либо
 - 3) Промыть поражённый участок большим количеством воды, обработать его спиртовой салфеткой
13. Жгут нельзя оставлять на конечности более чем на
- 1) 1 час летом и 2 часа зимой
 - 2) 2 часа
 - 3)+ 2 часа летом и 1 час зимой
14. Состояние травматического шока, тошнота, рвота (часто с кровью) при целостности наружных покровов наблюдаются при
- 1) Закрытых повреждениях лёгких
 - 2) Множественных переломах рёбер
 - 3)+ Закрытых повреждениях живота
15. К какой группе отравляющих веществ относится синильная кислота?
- 1)+ Общеядовитого действия
 - 2) Кожно-нарывного действия
 - 3) Нервно-паралитического действия
16. К какой группе отравляющих веществ относится [b]зоман[/b]?
- 1) Общеядовитого действия
 - 2)+ Нервно-паралитического действия
 - 3) Раздражающего действия
17. Антidot афин применяется при оказании первой помощи поражённым отравляющими веществами
- 1)+ Нервно-паралитического действия
 - 2) Кожно-нарывного действия
 - 3) Раздражающего действия
18. Первым признаком общего охлаждения (замерзания) не является
- 1) Сонливость
 - 2) Апатия, безволие
 - 3)+ Потеря сознания с угнетением всех жизненных функций
19. Для предотвращения испарения отравляющих веществ с обмундирования вне зоны заражения не используют
- 1) Дегазационный пакет порошковый
 - 2) Дегазационный пакет силикагелевый
 - 3)+ Пакет ИПП-8
20. На какую часть тела накладывается черепашья повязка?
- 1)+ На область локтевого и коленного суставов
 - 2) На плечевой сустав
 - 3) На грудную клетку
21. К какой группе отравляющих веществ относится хлорацетофенон?
- 1) Нервно-паралитического действия
 - 2)+ Раздражающего действия
 - 3) Кожно-нарывного действия

22. При каких ранениях накладывается окклюзионная (герметичная) повязка?
- 1)+ При проникающих ранениях грудной области
 - 2) При сквозных пулевых ранениях
 - 3) При несквозных пулевых ранениях
23. Если на отмороженном участке обнаружены пузыри или посинение необходимо
- 1) Проколоть пузыри и наложить повязку из ППИ
 - 2) Растереть повреждённый участок теплой рукой или рукавицей
 - 3)+ Наложить повязку из ППИ, не растирая повреждённый участок и не вскрывая пузырей
24. При наложении шины следует соблюдать следующее правило:
- 1) Шина накладывается всегда поверх одежды
 - 2) Шина накладывается всегда поверх стерильной повязки
 - 3)+ Шина накладывается поверх одежды на закрытый перелом и поверх стерильной повязки на открытый
25. Если при дыхании через портативный аппарат для обезболивания наступил наркотический сон необходимо
- 1) Привести пострадавшего в сознание, не прекращая обезболивание
 - 2) Срочно прекратить обезболивание и дать пострадавшему нашатырь
 - 3)+ Никаких дополнительных мер не требуется
26. К какой группе отравляющих веществ относится фосген?
- 1) Кожно-нарывного действия
 - 2)+ Удушающего действия
 - 3) Нервно-паралитического действия
27. Ингаляционный антидот (амилнитрит) вводится при поражении
- 1)+ Синильной кислотой и другими цианидами
 - 2) Зарином
 - 3) Фосгеном
28. При артериальном кровотечении в области шеи жгут накладывается
- 1)+ Через руку со здоровой стороны
 - 2) Через руку с повреждённой стороны
 - 3) Циркулярно вокруг шеи
29. При подъёме в гору носилки поворачивают
- 1)+ Головным концом вперёд
 - 2) Ножным концом вперёд
 - 3) Не имеет значения
30. При переломе обязательно необходимо выполнить
- 1) Наложение повязки
 - 2) Наложение жгута
 - 3)+ Транспортную иммобилизацию
31. При наложении жгута оказывающий помощь начинает с остановки кровотечения с помощью
- 1) Давящей повязки
 - 2) Перевязки сосуда в ране
 - 3)+ Пальцевого прижатия сосуда в типичном месте
32. Первая помощь при ушибах не направлена на
- 1)+ Остановку кровотечения
 - 2) Обезболивание
 - 3) Уменьшение кровоизлияния в ткани

33. При первых признаках отморожения необходимо

- 1)+ Растереть повреждённый участок теплой рукой или рукавицей
- 2) Растереть отмороженный участок снегом
- 3) Наложить толстую повязку, используя ИПП, подручные средства

34. К какой группе отравляющих веществ относится люизит?

- 1)+ Кожно-нарывного действия
- 2) Раздражающего действия
- 3) Удушающего действия

35. К достоверным признакам перелома не относится

- 1) Патологическая подвижность конечности
- 2)+ Покраснение
- 3) Наличие костных отломков в ране

36. В каких случаях необходимо внутривенное переливание кровозамещающего раствора из контейнера полимерного?

- 1) При всех ранениях.
- 2) При большой кровопотере.
- 3)+ При большой кровопотере или тяжёлых ожогах.

37. Если жгут пришлось наложить далеко от места ранения, то...

- 1) На рану дополнительно накладывают давящую повязку.
- 2)+ Накладывают второй жгут ближе к месту ранения а первый снимают.
- 3) Конечность дополнительно иммобилизируют.

38. При внезапной остановке дыхания и сердца реанимацию необходимо начинать...

- 1)+ В течение первых 5 минут
- 2) В течение первых 30 минут
- 3) В течение первых 60 минут

39. Разрешено ли вводить обезболивающее средство из шприц-тюбика через обмундирование?

- 1) Да.
- 2) Нет.
- 3)+ Только в срочных случаях.

40. При переноске раненого на носилках...

- 1)+ Один оказывающий помощь становится к головному концу носилок лицом к раненому, другой - к ножному концу спиной к нему
- 2) Один оказывающий помощь становится к головному концу носилок спиной к раненому, другой - к ножному концу лицом к нему
- 3) Оказывающие помощь становятся по бокам носилок

41. К способам оттаскивания раненых, применяемым в бою не относится:

- 1)+ Оттаскивание за конечности.
- 2) Оттаскивание на боку.
- 3) Оттаскивание на спине.

42. При артериальном кровотечении голени жгут накладывается ...

- 1) На нижнюю треть голени
- 2)+ На нижнюю треть бедра
- 3) На верхнюю треть голени

43. На какую часть тела накладывается крестообразная повязка?

- 1) На голеностопный сустав.
- 2) На плечевой сустав.
- 3)+ На грудную клетку.

generated at geetest.ru