

Goee Test



Тест по
сестринскому делу
в педиатрии

Тест по сестринскому делу в педиатрии (для аккредитации, ФМЗА)

Тест «Сестринское дело в педиатрии» (ФМЗА, MedEdTech) — подготовка к экзамену по специальности 99.02.19. Проверьте знания по уходу за детьми, педиатрии и неотложной помощи онлайн.



Тест из MedEdTech (ФМЗА)

Сестринское дело в педиатрии

Проверьте свои знания по сестринскому делу в педиатрии! Пройдите тест по специальности **99.02.19** и оцените свою подготовку.

Подготовьтесь к экзаменам и улучшите свои знания по уходу за детьми, основам педиатрии и неотложной помощи.

Начните тестирование прямо сейчас!

Сестринское дело в педиатрии

Тест «Сестринское дело в педиатрии» разработан на основе материалов MedEdTech (ФМЗА) и соответствует требованиям специальности 99.02.19. Он охватывает ключевые темы: уход за детьми разного возраста, основы педиатрии, диагностику состояний и алгоритмы оказания медицинской помощи.

Прохождение теста поможет оценить уровень подготовки, выявить слабые места и закрепить знания перед экзаменом или аккредитацией. Удобный формат позволяет тренироваться онлайн в любое время, повышая уверенность в профессиональных навыках медицинской сестры.

Тема 1. Общие вопросы профессиональной деятельности специалиста со средним медицинским образованием.

1. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ЕЕ ВИДАМ ВКЛЮЧАЕТ

- 1)+ этапы оказания медицинской помощи
- 2) кратность применения медицинской услуги
- 3) рекомендуемые к применению лекарственные препараты
- 4) виды лечебного питания

2. МЕДИЦИНСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО БЕЗ СОГЛАСИЯ ГРАЖДАНИНА, ОДНОГО ИЗ РОДИТЕЛЕЙ ИЛИ ИНОГО ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ДОПУСКАЕТСЯ В ОТНОШЕНИИ

- 1)+ лица, страдающего тяжелыми психическими расстройствами
- 2) лица, не достигшего 15-летнего возраста
- 3) несовершеннолетнего больного наркоманией при оказании ему наркологической помощи
- 4) лица, признанного в установленном законом порядке недееспособным

3. СТАНДАРТ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ И СОСТОЯНИЯХ ВКЛЮЧАЕТ

- 1)+ рекомендуемые к применению лекарственные препараты
- 2) правила организации деятельности медицинской организации
- 3) оснащение медицинской организации
- 4) рекомендуемые штатные нормативы

4. МЕДИЦИНСКИЙ РАБОТНИК НЕСЕТ УГОЛОВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В СЛУЧАЕ

- 1)+ занятия незаконной медицинской деятельностью
- 2) отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение четырех часов подряд
- 3) нарушения требований пожарной безопасности
- 4) нарушения требований санитарных норм и правил

5. ДОКУМЕНТОМ, УДОСТОВЕРЯЮЩИМ ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ФАКТ, СОБЫТИЕ ИЛИ ДЕЙСТВИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ акт
- 2) справка
- 3) протокол
- 4) приказ

6. ОДНИМ ИЗ ПРИЗНАКОВ СИНДРОМА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ У МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ отстраненность от пациентов и работы
- 2) высокая работоспособность
- 3) активное участие в жизни коллектива
- 4) заинтересованность в результате труда

7. ОСНОВНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ ЭЛЕКТРОННОЙ ТАБЛИЦЫ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ ячейка
- 2) столбец
- 3) лист
- 4) строка

8. ПРОГУЛОМ СЧИТАЕТСЯ ОТСУТСТВИЕ СОТРУДНИКА НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ БЕЗ УВАЖИТЕЛЬНЫХ ПРИЧИН В ТЕЧЕНИЕ _____ ЧАСОВ ПОДРЯД

- 1)+ 4
- 2) 5
- 3) 2
- 4) 3

9. МЕДИЦИНСКИЙ РАБОТНИК СО СРЕДНИМ МЕДИЦИНСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ, ИМЕЮЩИЙ СЕРТИФИКАТ СПЕЦИАЛИСТА (СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ АККРЕДИТАЦИИ) ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО, БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИМЕЕТ ПРАВО РАБОТАТЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРОЙ

- 1)+ палатной терапевтического отделения
- 2) палатной детского отделения
- 3) по массажу
- 4) операционной

10. МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ, НЕПОСРЕДСТВЕННО УЧАСТВУЮЩИЕ В ОКАЗАНИИ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНОЙ ПОМОЩИ, ИМЕЮТ ПРАВО НА ЕЖЕГОДНЫЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОПЛАЧИВАЕМЫЙ ОТПУСК В КОЛИЧЕСТВЕ ____ ДНЕЙ

- 1)+ 14
- 2) 10
- 3) 28
- 4) 3

11. ДАННЫЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ОСМОТРА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ВНОСЯТСЯ В УЧЕТНУЮ ФОРМУ

- 1)+ 030-ПО/у-17
- 2) 025/у
- 3) 025-1/у
- 4) 030-ПО/у-12

12. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

- 1)+ отрицательным естественным приростом
- 2) демографическим взрывом
- 3) нулевым естественным приростом
- 4) положительным естественным приростом

13. МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ СО СРЕДНИМ МЕДИЦИНСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОКАЗЫВАЮТ

- 1)+ первичную доврачебную медико-санитарную помощь
- 2) первичную врачебную медико-санитарную помощь
- 3) первичную специализированную медико-санитарную помощь
- 4) специализированную медицинскую помощь

14. ПОСТИЖЕНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ ДРУГОГО ЧЕЛОВЕКА, СОПЕРЕЖИВАНИЕ ПРИ ОБЩЕНИИ НАЗЫВАЕТСЯ

- 1)+ эмпатия
- 2) рефлексия
- 3) экспрессивность
- 4) рационализация

15. СТИЛЕМ ПОВЕДЕНИЯ В МЕЖЛИЧНОСТНОМ КОНФЛИКТЕ, ПРЕДПОЛАГАЮЩЕМ ВЗАИМНЫЕ УСТУПКИ ДЛЯ НАХОЖДЕНИЯ ПРИЕМЛЕМОГО ДЛЯ ПРОТИВОСТОЯЩИХ СТОРОН РЕШЕНИЯ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ компромисс
- 2) противоборство
- 3) уклонение
- 4) приспособление

16. НАЛИЧИЕ ОСТАТОЧНЫХ КОЛИЧЕСТВ ЩЕЛОЧНЫХ КОМПОНЕНТОВ МОЮЩИХ СРЕДСТВ ПОСЛЕ ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННОЙ ОЧИСТКИ ПРОВЕРЯЮТ ПУТЕМ ПОСТАНОВКИ _____ ПРОБЫ

- 1)+ фенолфталеиновой
- 2) азопирамовой
- 3) лакмусовой
- 4) судановой

17. ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА ПРОЦЕДУРНОГО КАБИНЕТА ДЕТСКОГО СОМАТИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПРОВОДИТСЯ

- 1)+ один раз в семь дней
- 2) ежедневно
- 3) один раз в три дня
- 4) один раз в месяц

18. ПЕРЧАТКИ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ ОБЯЗАТЕЛЬНО НАДЕВАЕТ ПЕРЕД ВЫПОЛНЕНИЕМ ПРОЦЕДУРЫ

- 1)+ внутримышечной инъекции
- 2) измерения пульса
- 3) регистрации ЭКГ
- 4) измерения артериального давления

19. К МЕДИЦИНСКИМ ОТХОДАМ КЛАССА А ОТНОСЯТСЯ

- 1)+ пищевые отходы соматических отделений
- 2) отходы микробиологических лабораторий
- 3) радиоактивные отходы
- 4) пищевые отходы инфекционных отделений

20. МНОГОРАЗОВЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ ОТХОДОВ КЛАССА А ПОДЛЕЖАТ ДЕЗИНФЕКЦИИ НЕ РЕЖЕ ОДНОГО РАЗА

- 1)+ в неделю
- 2) в месяц
- 3) в 2 недели
- 4) в 3 недели

21. ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ПЕРЧАТКИ ПОСЛЕ ПАРЕНТЕРАЛЬНЫХ МАНИПУЛЯЦИЙ УДАЛЯЮТ КАК МЕДИЦИНСКИЕ ОТХОДЫ КЛАССА

- 1)+ Б
- 2) А
- 3) В
- 4) Г

22. К ХИМИЧЕСКОМУ МЕТОДУ СТЕРИЛИЗАЦИИ ОТНОСИТСЯ

- 1)+ газовый
- 2) паровой
- 3) плазменный
- 4) воздушный

23. ДЕЗИНФЕКЦИЯ МНОГОРАЗОВЫХ ЕМКОСТЕЙ ДЛЯ СБОРА МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ КЛАССА Б ВНУТРИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОЛЖНА ПРОИЗВОДИТЬСЯ _____

- 1)+ ежедневно
- 2) один раз в неделю
- 3) один раз в три дня
- 4) два раза в день

24. ЖИВЫЕ ВАКЦИНЫ, НЕПРИГОДНЫЕ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ, ОТНОСЯТСЯ К ОТХОДАМ КЛАССА ____

- 1)+ В
- 2) А
- 3) Б
- 4) Г

25. КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПОПАДАНИЯ ИНФЕКЦИИ В РАНУ НАЗЫВАЕТСЯ

- 1)+ асептика
- 2) антисептика
- 3) дезинфекция
- 4) стерилизация

26. МАКСИМАЛЬНАЯ ВМЕСТИМОСТЬ ПАЛАТ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДО ОДНОГО ГОДА (КРОМЕ НОВОРОЖДЕННЫХ) СОСТАВЛЯЕТ _____ КОЙКИ

- 1)+ 2
- 2) 3
- 3) 6
- 4) 4

27. МЕСТОМ ВЫПОЛНЕНИЯ ВНУТРИМЫШЕЧНОЙ ИНЪЕКЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ _____ КВАДРАНТ ЯГОДИЦЫ

- 1)+ верхний наружный
- 2) верхний внутренний
- 3) нижний наружный
- 4) нижний внутренний

28. ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ ПРОМЫВАНИЯ ЖЕЛУДКА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ желудочное кровотечение
- 2) отравление грибами
- 3) отравление алкоголем
- 4) эндогенная интоксикация

29. СРОК ХРАНЕНИЯ ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ ПРИ ОТСУТСТВИИ СПЕЦИАЛЬНО ВЫДЕЛЕННОГО ХОЛОДИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ СОСТАВЛЯЕТ НЕ БОЛЕЕ ____ ЧАСОВ

- 1)+ 24
- 2) 36
- 3) 48
- 4) 72

30. СТЕРИЛЬНЫЙ СТОЛ НАКРЫВАЮТ НЕ БОЛЕЕ ЧЕМ НА _____ ЧАСОВ

- 1)+ 6
- 2) 8
- 3) 10
- 4) 3

31. ПРИ ПОПАДАНИИ МАСЛЯНЫХ РАСТВОРОВ И СУСПЕНЗИЙ В КРОВЕНОСНЫЙ СОСУД ВОЗМОЖНО РАЗВИТИЕ

- 1)+ эмболии
- 2) флегмоны
- 3) кровотечения
- 4) спазма сосуда

32. В МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДОЛЖЕН БЫТЬ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ _____ ЗАПАС ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ СРЕДСТВ РАЗЛИЧНОГО ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И НАЗНАЧЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С РАСЧЕТНОЙ ПОТРЕБНОСТЬЮ

- 1)+ месячный
- 2) недельный
- 3) пятидневный
- 4) годовой

33. ОТХОДЫ КЛАССА Б СОБИРАЮТСЯ В ОДНОРАЗОВУЮ МЯГКУЮ (ПАКЕТЫ) ИЛИ ТВЕРДУЮ (НЕПРОКАЛЫВАЕМУЮ) УПАКОВКУ (КОНТЕЙНЕРЫ) _____ ЦВЕТА

- 1)+ желтого
- 2) белого
- 3) черного
- 4) красного

34. ПРИ ПЕРЕЛОМЕ БЕДРА ФИКСИРУЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ СУСТАВЫ

- 1)+ тазобедренный, коленный и голеностопный
- 2) тазобедренный и коленный
- 3) тазобедренный и голеностопный
- 4) коленный и голеностопный

35. ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ОТЕКА МОЗГА ПРИ ГИПОГЛИКЕМИЧЕСКОЙ КОМЕ ВВОДЯТ

- 1)+ маннитол
- 2) глюкозу
- 3) инсулин
- 4) нитроглицерин

36. ПРИ ОКАЗАНИИ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНОМУ С ОБМОРОКОМ ЕГО УКЛАДЫВАЮТ

- 1)+ с приподнятым ножным концом
- 2) с приподнятым головным концом
- 3) строго горизонтально
- 4) на бок

37. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ СООТНОШЕНИЕ ВДУВАНИЙ В ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПУТИ ВЗРОСЛОГО ПАЦИЕНТА И КОМПРЕССИЙ НА ГРУДИНУ СОСТАВЛЯЕТ

- 1)+ 2:30
- 2) 2:15
- 3) 1:15
- 4) 1:20

38. ЛЕЖА НА СПИНЕ НА ШИТЕ ТРАНСПОРТИРУЮТ ПАЦИЕНТА С ПЕРЕЛОМОМ

- 1)+ поясничного отдела позвоночника
- 2) ребер
- 3) костей голени
- 4) костей предплечья

39. ОТСУТСТВИЕ ПОМОЩИ ТЯЖЕЛО ПОРАЖЕННЫМ В ОЧАГЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ В ТЕЧЕНИЕ 1 Ч ПОСЛЕ ПОРАЖЕНИЯ УВЕЛИЧИВАЕТ КОЛИЧЕСТВО ЛЕТАЛЬНЫХ ИСХОДОВ СРЕДИ ТЯЖЕЛО ПОРАЖЕННЫХ НА ____ %

- 1)+ 30
- 2) 60
- 3) 20
- 4) 90

40. ОЖОГИ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ ПРИРАВНИВАЮТСЯ К ГЛУБОКОМУ ОЖОГУ _____ % ПОВЕРХНОСТИ ТЕЛА ПОСТРАДАВШЕГО

- 1)+ 10
- 2) 5
- 3) 20
- 4) 25

41. К АВАРИЙНО ХИМИЧЕСКИ ОПАСНОМУ ВЕЩЕСТВУ (АХОВ) УДУШАЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ НА ОРГАНИЗМ ОТНОСИТСЯ

- 1)+ хлор
- 2) аммиак
- 3) оксид углерода II (угарный газ)
- 4) карбофос

42. ПРИ ОТМОРОЖЕНИИ КИСТИ НАКЛАДЫВАЮТ ПОВЯЗКУ

- 1)+ варежку
- 2) спиральную
- 3) крестообразную
- 4) восьмиобразную

43. КРИТЕРИЕМ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОВОДИМОЙ ИСКУССТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЕГКИХ ЯВЛЯЕТСЯ:

- 1)+ экскурсия грудной клетки
- 2) бледность кожных покровов
- 3) появление пульса на сонной артерии
- 4) вздутие эпигастральной области

44. ПРИ СИНДРОМЕ ДЛИТЕЛЬНОГО СДАВЛЕНИЯ ЦЕЛЮЮ НАЛОЖЕНИЯ ЖГУТА ВЫШЕ МЕСТА ПОВРЕЖДЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ предотвращение токсемии
- 2) остановка венозного кровотечения
- 3) предотвращение плазмопотери
- 4) создание депо венозной крови

45. АЛАЯ ПУЛЬСИРУЮЩАЯ СТРУЯ КРОВИ ХАРАКТЕРНА ДЛЯ _____ КРОВОТЕЧЕНИЯ

- 1)+ артериального
- 2) венозного
- 3) смешанного
- 4) капиллярного

46. ОТЛИЧИТЕЛЬНЫМ ПРИЗНАКОМ ОЖОГА 2 СТЕПЕНИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ наличие пузырей или их остатков
- 2) гиперемия кожи
- 3) некроз тканей
- 4) отек тканей

47. СИМПТОМ «ПРИЛИПШЕЙ» ПЯТКИ ХАРАКТЕРЕН ДЛЯ ПЕРЕЛОМА

- 1)+ шейки бедра
- 2) позвоночника
- 3) костей голени
- 4) костей стопы

48. К ПЕРВОЙ СОРТИРОВОЧНОЙ ГРУППЕ ОТНОСЯТ ПОСТРАДАВШИХ, ИМЕЮЩИХ

- 1)+ крайне тяжелые, несовместимые с жизнью повреждения
- 2) повреждения средней тяжести, без непосредственной угрозы для жизни
- 3) легкие повреждения, требующие амбулаторного лечения
- 4) тяжелые повреждения, с нарастанием расстройств жизненно-важных функций

49. ДЛЯ ОЦЕНКИ СТЕПЕНИ УГНЕТЕНИЯ СОЗНАНИЯ ЧЕЛОВЕКА ПРИМЕНЯЕТСЯ ШКАЛА

- 1)+ Глазго
- 2) Апгар
- 3) SCORE
- 4) Ross

50. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МЕДИЦИНСКОЙ СОРТИРОВКИ ПОСТРАДАВШИЙ С СОСТОЯНИЕМ СРЕДНЕЙ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ ОБОЗНАЧАЕТСЯ СОРТИРОВОЧНОЙ МАРКОЙ _____ ЦВЕТА

- 1)+** желтого
- 2) красного
- 3) зеленого
- 4) черного

51. СОСТОЯНИЕМ, ПРИ КОТОРОМ ПРОИСХОДИТ КРАТКОВРЕМЕННАЯ ПОТЕРЯ СОЗНАНИЯ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+** обморок
- 2) кома
- 3) коллапс
- 4) сопор

52. ЛЕКАРСТВЕННОЕ ВЕЩЕСТВО, СВОЙСТВА КОТОРОГО НАПРАВЛЕНЫ НА ОСЛАБЛЕНИЕ ИЛИ ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ЯДА, НАЗЫВАЕТСЯ

- 1)+** антидот
- 2) сорбент
- 3) реагент
- 4) катализатор

53. К НЕУСТРАНИМЫМ (НЕМОДИФИЦИРУЕМЫМ) ФАКТОРАМ РИСКА ХРОНИЧЕСКИХ НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОТНОСИТСЯ

- 1)+** возраст
- 2) курение
- 3) артериальная гипертензия
- 4) избыточный вес

54. К МОЧЕГОННЫМ ПРЕПАРАТАМ ОТНОСИТСЯ

- 1)+** фуросемид
- 2) фурагин
- 3) фурадонин
- 4) фуразолидон

Тема 2. Участие в оказании медицинской помощи новорожденным.

1. В МЕСТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ИММУНИЗАЦИИ ОБЯЗАТЕЛЬНО НАЛИЧИЕ СРЕДСТВ _____ ТЕРАПИИ

- 1)+ противошоковой
- 2) регидратационной
- 3) антисекреторной
- 4) антидотной

2. ПРИ ПЕРЕЛОМЕ КЛЮЧИЦЫ У НОВОРОЖДЕННОГО ЕГО УКЛАДЫВАЮТ

- 1)+ на здоровый бок
- 2) на бок со стороны перелома
- 3) на живот
- 4) на спину

3. ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ПАЛАТЕ ДЛЯ НЕДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ СОСТАВЛЯЕТ _____ ГРАДУСОВ ЦЕЛЬСИЯ

- 1)+ 24
- 2) 18
- 3) 22
- 4) 28

4. У НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ, ТРЕБУЮЩИХ ИСКУССТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЕГКИХ, ОПТИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВДОХЕ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ

- 1)+ степенью морфо-функциональной зрелости легких
- 2) оценкой в баллах по шкале Апгар
- 3) частотой дыхательных движений
- 4) весом новорожденного

5. СРОК ХРАНЕНИЯ ГРУДНОГО МОЛОКА В ХОЛОДИЛЬНИКЕ СОСТАВЛЯЕТ НЕ БОЛЕЕ _____ ЧАСОВ

- 1)+ 24
- 2) 12
- 3) 18
- 4) 36

6. ПРИ НАЛИЧИИ ПОКАЗАНИЙ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫМ СЧИТАЕТСЯ ВВЕДЕНИЕ СУРФАКТАНТА В ПЕРВЫЕ _____ МИНУТ ЖИЗНИ РЕБЕНКА

- 1)+ 15
- 2) 40
- 3) 25
- 4) 30

7. ПРИ ОТСУТСТВИИ СЕРДЦЕБИЕНИЯ У НОВОРОЖДЕННОГО, РЕАНИМАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В РОДИЛЬНОМ ЗАЛЕ ПРЕКРАЩАЮТСЯ ЧЕРЕЗ ____ МИН

- 1)+ 10
- 2) 5
- 3) 15
- 4) 20

8. ТЕСТ-БЛАНКИ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ОБРАЗЦОВ КРОВИ НОВОРОЖДЕННЫХ В РАМКАХ НЕОНАТАЛЬНОГО СКРИНИНГА ДОСТАВЛЯЮТСЯ ИЗ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВИВШЕЙ ЗАБОР ОБРАЗЦОВ КРОВИ, В МЕДИКО-ГЕНЕТИЧЕСКУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ ЕЖЕДНЕВНО ИЛИ 1 РАЗ В ____ ДНЯ (ДНЕЙ)

- 1)+ 2
- 2) 3
- 3) 4
- 4) 5

9. РЕАКЦИЯ НОВОРОЖДЕННОГО НА ПРОВОДИМЫЕ В РОДИЛЬНОМ ЗАЛЕ РЕАНИМАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ОЦЕНИВАЕТСЯ

- 1)+ каждые 30 секунд
- 2) в первую и пятую минуты
- 3) через 10 минут
- 4) каждую минуту

10. ТЯЖЕЛЕЕ ВСЕГО ПРОТЕКАЕТ _____ ФОРМА ГЕМОЛИТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ НОВОРОЖДЕННОГО

- 1)+ отечная
- 2) желтушная
- 3) анемическая
- 4) смешанная

11. ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ НОСОВЫХ ХОДОВ НОВОРОЖДЕННОГО ИСПОЛЬЗУЮТ

- 1)+ ватные жгутики
- 2) палочки с ватой
- 3) марлевые салфетки
- 4) пинцет с ватным шариком

12. ОЦЕНКА НОВОРОЖДЕННОГО ПО ШКАЛЕ АПГАР ПРОВОДИТСЯ ЧЕРЕЗ _____ И _____ МИНУТ ПОСЛЕ РОЖДЕНИЯ

- 1)+ одну и пять
- 2) одну и две
- 3) пять и десять
- 4) три и пять

13. ЧАЩЕ ВСЕГО ОМФАЛИТ У НОВОРОЖДЕННОГО В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ РОДОВСПОМОЖЕНИЯ ВЫЗЫВАЕТ

- 1)+ золотистый стафилококк
- 2) пневмококк
- 3) кишечная палочка
- 4) протей

14. МОНИТОРИНГ ОКСИГЕНАЦИИ КРОВИ НЕДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ В РОДИЛЬНОМ ЗАЛЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ

- 1)+ пульсоксиметром
- 2) капнографом
- 3) спирометром
- 4) калориметром

15. АУДИОЛОГИЧЕСКИЙ СКРИНИНГ НОВОРОЖДЕННОМУ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ

- 1)+ перед выпиской из родильного отделения
- 2) сразу после рождения
- 3) на второй день после рождения
- 4) на четвертый день после рождения

16. ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ РОДИЛЬНИЦЕ МЕНЯЕТСЯ

- 1)+ раз в три дня
- 2) ежедневно
- 3) раз в неделю
- 4) раз в 10 дней

17. СРЕДНЯЯ МАССА ТЕЛА ДОНОШЕННОГО НОВОРОЖДЕННОГО СОСТАВЛЯЕТ _____ ГРАММ

- 1)+ 3000-3500
- 2) 4500-5000
- 3) 2500-3000
- 4) 2000-2500

18. НЕОНАТАЛЬНЫЙ СКРИНИНГ ПРОВОДЯТ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ

- 1)+ фенилкетонурии
- 2) гомоцистинурии
- 3) мукополисахаридоза
- 4) тиреотоксикоза

19. ПРИ ОЖИДАЮЩИХСЯ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДАХ ТЕМПЕРАТУРА В РОДИЛЬНОМ ЗАЛЕ ДОЛЖНА СОСТАВЛЯТЬ _____ ГРАДУСОВ ЦЕЛЬСИЯ

- 1)+ 26-28
- 2) 18-20
- 3) 20-22
- 4) 22-24

20. ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ ТУБЕРКУЛЕЗА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЗДОРОВОМУ ДОНОШЕННОМУ НОВОРОЖДЕННОМУ

- 1)+ на 3-7 день жизни
- 2) в первые 24 часа после рождения
- 3) в один месяц
- 4) в полтора месяца

21. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ ПОТЕРИ МАССЫ ТЕЛА У ЗДОРОВОГО ДОНОШЕННОГО НОВОРОЖДЕННОГО НАСТУПАЕТ К _____ ДНЮ ЖИЗНИ

- 1)+ 6-7
- 2) 2-3
- 3) 10-12
- 4) 14-15

22. В ТЕЧЕНИЕ ПЕРВЫХ СУТОК ЖИЗНИ ЗДОРОВЫЙ НОВОРОЖДЕННЫЙ ОСМАТРИВАЕТСЯ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРОЙ КАЖДЫЕ _____ (ЧАС)

- 1)+ 3
- 2) 1
- 3) 5
- 4) 6

23. ВРЕМЕННЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ НОВОРОЖДЕННОГО ГРУДЬЮ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ родовая травма
- 2) фенилкетонурия
- 3) галактоземия
- 4) болезнь «кленового сиропа»

24. АБСОЛЮТНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ К КОРМЛЕНИЮ ГРУДЬЮ СО СТОРОНЫ МАТЕРИ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЕМ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

- 1)+ метотрексат
- 2) бифиформ
- 3) апилак
- 4) витамина Д

25. ПИТАНИЕ НОВОРОЖДЕННОГО С РЕСПИРАТОРНЫМ ДИСТРЕСС СИНДРОМОМ В ПЕРВЫЕ ДВОЕ СУТОК ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ

- 1)+ парентерально
- 2) с ложечки
- 3) из бутылочки
- 4) грудью

26. ПЕРВАЯ ВАКЦИНАЦИЯ НОВОРОЖДЕННОМУ ПРОТИВ ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА В ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ

- 1)+ в первые 24 часа после рождения
- 2) при выписке из родильного отделения
- 3) на третий день жизни
- 4) на седьмой день жизни

27. ЗАБОР ОБРАЗЦОВ КРОВИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МАССОВОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ НА НАСЛЕДСТВЕННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЧЕРЕЗ 3 ЧАСА ПОСЛЕ КОРМЛЕНИЯ В ВОЗРАСТЕ ____ ЧАСОВ ЖИЗНИ

- 1)+ 24-48
- 2) 6-12
- 3) 144-168
- 4) 72-96

28. К ТРАНЗИТОРНЫМ СОСТОЯНИЯМ НОВОРОЖДЕННЫХ ОТНОСИТСЯ

- 1)+ простая эритема
- 2) гемолитическая болезнь новорожденных
- 3) омфалит
- 4) пузырчатка новорожденных

29. МАКСИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ САМОРАСПРАВЛЯЮЩЕГОСЯ МЕШКА ПРИ ПРИВЕДЕНИИ ИВЛ НОВОРОЖДЕННЫМ СОСТАВЛЯЕТ ____ МЛ

- 1)+ 240
- 2) 350
- 3) 400
- 4) 440

30. ПАЛАТЫ НОВОРОЖДЕННЫХ С РАЗДЕЛЬНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ МАТЕРИ И РЕБЕНКА ЗАПОЛНЯЮТ СИНХРОННО С ПАЛАТАМИ ПОСЛЕРОДОВОГО ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ В ТЕЧЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ ____ КАЛЕНДАРНЫХ ДНЕЙ

- 1)+ 3
- 2) 2
- 3) 4
- 4) 5

31. ЗАПОЛНЕНИЕ ПАЛАТЫ ПРИ СОВМЕСТНОМ ПРЕБЫВАНИИ МАТЕРИ И РЕБЕНКА ПРОИСХОДИТ В ТЕЧЕНИЕ _____ ЧАСОВ

- 1)+ 24
- 2) 48
- 3) 72
- 4) 12

32. ДОПУСКАЕТСЯ ХРАНЕНИЕ СЦЕЖЕННОГО МОЛОКА ПРИ КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ НЕ ВЫШЕ 25 °С В ТЕМНОМ МЕСТЕ НЕ БОЛЕЕ ____ ЧАСОВ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИ СЛЕДУЮЩЕМ КОРМЛЕНИИ РЕБЕНКА

- 1)+ 2
- 2) 3
- 3) 6
- 4) 8

33. ПРИ ТЯЖЕЛОЙ ФОРМЕ ГЕМОЛИТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ НОВОРОЖДЕННОГО С БЫСТРЫМ НАРАСТАНИЕМ ЖЕЛТУХИ ПРОВОДЯТ

- 1)+ заменное переливание крови
- 2) плазмаферез
- 3) гемосорбцию
- 4) инфузионную терапию

34. НАЧАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ ЭНТЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ С МАССОЙ ТЕЛА МЕНЕЕ 750 Г СОСТАВЛЯЕТ ____ МЛ

- 1)+ 0,5
- 2) 1,5
- 3) 2
- 4) 0,1

35. С ЦЕЛЬЮ ПОДДЕРЖКИ ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ ПЕРВОЕ ПРИКЛАДЫВАНИЕ К ГРУДИ ЗДОРОВОГО НОВОРОЖДЕННОГО ДОЛЖНО ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ НЕ ПОЗДНЕЕ ____ (ЧАС) ПОСЛЕ РОЖДЕНИЯ

- 1)+ 2
- 2) 1
- 3) 3
- 4) 4

36. БРАХИЦЕФАЛИЯ, КОСОЙ РАЗРЕЗ ГЛАЗ, ПЛОСКОЕ ЛИЦО, ПОПЕРЕЧНАЯ СКЛАДКА НА ЛАДОНИ У НОВОРОЖДЕННОГО ЯВЛЯЮТСЯ ПРИЗНАКАМИ

- 1)+ болезни Дауна
- 2) фенилкетонурии
- 3) муковисцидоза
- 4) галактоземии

37. МОРФОЛОГИЧЕСКИМ ПРИЗНАКОМ НЕДОНОШЕННОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ тонкая, морщинистая кожа, покрыта пушком
- 2) закрытый малый родничок
- 3) расположение ногтей до краев ногтевого ложа
- 4) хорошее развитие подкожной жировой клетчатки

38. ДОНОШЕННЫМ СЧИТАЕТСЯ РЕБЕНОК, РОДИВШИЙСЯ ПРИ СРОКЕ БЕРЕМЕННОСТИ _____ (НЕДЕЛЯ)

- 1)+ 38-42
- 2) 35-37
- 3) 32-34
- 4) 28-30

39. В ПЕРВЫЕ НЕДЕЛИ ЖИЗНИ ВЛАЖНОСТЬ В ИНКУБАТОРЕ ДЛЯ ВЫХАЖИВАНИЯ ДЕТЕЙ С ОЧЕНЬ НИЗКОЙ МАССОЙ ТЕЛА НЕОБХОДИМО ПОДДЕРЖИВАТЬ НА УРОВНЕ ____ ПРОЦЕНТОВ

- 1)+ 95
- 2) 100
- 3) 90
- 4) 85

40. ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ НОВОРОЖДЕННОГО ПРИ РОЖДЕНИИ ОЦЕНИВАЮТ ПО ШКАЛЕ

- 1)+ Апгар
- 2) Глазго
- 3) Ross
- 4) SCORE

41. САМОЙ ЧАСТОЙ ПРИЧИНОЙ СЕПСИСА У НОВОРОЖДЕННЫХ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ пузырьчатка новорожденных
- 2) токсическая эритема
- 3) потница
- 4) омфалит

42. СРЕДНЕЕ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ СНИЖЕНИЕ МАССЫ ТЕЛА ДОНОШЕННОГО НОВОРОЖДЕННОГО СОСТАВЛЯЕТ _____ ПРОЦЕНТОВ ОТ МАССЫ ТЕЛА ПРИ РОЖДЕНИИ

- 1)+ 6-8
- 2) 12-15
- 3) 1-2
- 4) 14-18

43. ДЛЯ СТИМУЛЯЦИИ РЕГУЛЯРНОГО ДЫХАНИЯ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ АПНОЭ У НОВОРОЖДЕННЫХ С НИЗКОЙ МАССОЙ ТЕЛА ИСПОЛЬЗУЮТ

- 1)+ кофеин-бензоат натрия
- 2) эпинефрин
- 3) преднизолон
- 4) порактант альфа

44. ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ТАКТИЛЬНОЙ СТИМУЛЯЦИИ ПРИ ОТСУТСТВИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ДЫХАНИЯ У НОВОРОЖДЕННОГО СОСТАВЛЯЕТ

- 1)+ 10-15 секунд
- 2) 30-40 секунд
- 3) 1-2 минуты
- 4) 3-4 минуты

45. К ВОЗНИКНОВЕНИЮ ГЕМОЛИТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ НОВОРОЖДЕННЫХ ПРИВОДИТ

- 1)+ резус-конфликт
- 2) родовая травма
- 3) внутриутробное инфицирование
- 4) вирусный гепатит

46. ЦЕЛЕВЫМ ПОКАЗАТЕЛЕМ ОКСИГЕНАЦИИ КРОВИ ГЛУБОКО НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ НА 5 ОЙ МИНУТЕ ЖИЗНИ ЯВЛЯЕТСЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ КИСЛОРОДА _____ ПРОЦЕНТОВ

- 1)+ 80-85
- 2) 85-95
- 3) 70-75
- 4) 65-70

47. ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ ДЛЯ КУПАНИЯ ДОНОШЕННОГО НОВОРОЖДЕННОГО СОСТАВЛЯЕТ _____ГРАДУСОВ ЦЕЛЬСИЯ

- 1)+ 37
- 2) 39
- 3) 34
- 4) 40

48. ПОКАЗАНИЕМ К ПРОВЕДЕНИЮ НЕПРЯМОГО МАССАЖА СЕРДЦА У НОВОРОЖДЕННОГО ЯВЛЯЕТСЯ ЧАСТОТА СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ МЕНЕЕ ____ УДАРОВ В МИНУТУ

- 1)+ 60
- 2) 80
- 3) 90
- 4) 100

49. ЧАСТОТА СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ У ЗДОРОВОГО ДОНОШЕННОГО НОВОРОЖДЕННЫХ СОСТАВЛЯЕТ _____ УДАРОВ В МИНУТУ

- 1)+ 120-140
- 2) 170 -190
- 3) 100-120
- 4) 80-100

50. ЗАКРЫТЫЕ ЕМКОСТИ С ЗАМОРОЖЕННЫМ ГРУДНЫМ МОЛОКОМ МОГУТ ХРАНИТЬСЯ В СПЕЦИАЛЬНО ПРЕДНАЗНАЧЕННОМ МОРОЗИЛЬНИКЕ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ НЕ ВЫШЕ МИНУС 18 °С В ТЕЧЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ ____ МЕСЯЦЕВ

- 1)+ 3
- 2) 5
- 3) 2
- 4) 6

51. ГЕНЕРАЛИЗОВАННОЙ ФОРМОЙ ГНОЙНО-СЕПТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ НОВОРОЖДЕННЫХ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ сепсис
- 2) парапроктит
- 3) омфалит
- 4) везикулопустулез

52. ДЕЗИНФЕКЦИЮ КУВЕЗОВ ПРОВОДЯТ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИМИ СРЕДСТВАМИ, СОДЕРЖАЩИМИ

- 1)+ кислород
- 2) хлор
- 3) фенолы
- 4) альдегиды

53. ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПЕРИОДА НОВОРОЖДЕННОСТИ СОСТАВЛЯЕТ ____ ДНЕЙ С МОМЕНТА РОЖДЕНИЯ

- 1)+ 28
- 2) 14
- 3) 36
- 4) 48

54. ПОСЛЕДУЮЩАЯ ЗАДЕРЖКА ФИЗИЧЕСКОГО И ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ У ДЕТЕЙ, РОДИВШИХСЯ В АСФИКСИИ, СВЯЗАНЫ С НАРУШЕНИЕМ ФУНКЦИИ

- 1)+ центральной нервной системы
- 2) системы кровообращения
- 3) легких
- 4) почек

55. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИНФЕКЦИОННОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ НОВОРОЖДЕННЫХ И РОДИЛЬНИЦ ДОЛЖНА БЫТЬ ПЕРЕДАНА В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН РОСПОТРЕБНАДЗОРА НЕ ПОЗДНЕЕ ____ ЧАСОВ

- 1)+ 12
- 2) 24
- 3) 6
- 4) 36

56. ОПТИМАЛЬНЫМ ВРЕМЕНЕМ ПЕРВОГО ПРИКЛАДЫВАНИЯ ЗДОРОВОГО ДОНОШЕННОГО НОВОРОЖДЕННОГО К ГРУДИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ первые 30 минут
- 2) первые сутки
- 3) первые 12 часов
- 4) вторые сутки

57. ЭПИНЕФРИН ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПЕРВИЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ НОВОРОЖДЕННОМУ ВВОДИТСЯ ВНУТРИВЕННО ИЗ РАСЧЕТА ____ МЛ НА КГ ВЕСА

- 1)+ 0,1
- 2) 0,01-0,03
- 3) 0,5-0,7
- 4) 1-2

58. МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ ПРИ ОЦЕНКЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ НОВОРОЖДЕННОГО СОСТАВЛЯЕТ

- 1)+ 10
- 2) 8
- 3) 12
- 4) 14

59. ОДНИМ ИЗ ФАКТОРОВ РИСКА РАЗВИТИЯ ГИПОКСИИ ПЛОДА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ длительный безводный период
- 2) срочные роды
- 3) головное предлежание
- 4) продолжительность первых родов 10 часов

60. ОЦЕНКА ПО ШКАЛЕ АПГАР В 5 БАЛЛОВ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ ОБ _____ АСФИКСИИ НОВОРОЖДЕННОГО

- 1)+ умеренной
- 2) легкой
- 3) тяжелой
- 4) очень тяжелой

61. НАЧАЛЬНАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ ШУМА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ АУДИОЛОГИЧЕСКОГО СКРИНИНГА У НОВОРОЖДЕННОГО СОСТАВЛЯЕТ ____ ДБ УРОВНЯ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ (УЗД)

- 1)+ 90
- 2) 60
- 3) 150
- 4) 50

62. ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ К РАННЕМУ ПРИКЛАДЫВАНИЮ К ГРУДИ СО СТОРОНЫ МАТЕРИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ открытая форма туберкулеза
- 2) избыточная масса тела
- 3) тугие соски
- 4) компенсированная артериальная гипертензия

63. ОДНИМ ИЗ ОБЩЕМОЗГОВЫХ СИМПТОМОВ ПРИ ВНУТРИЧЕРЕПНОЙ МОЗГОВОЙ ТРАВМЕ У НОВОРОЖДЕННОГО ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ монотонный крик
- 2) парез
- 3) паралич
- 4) опущение угла рта

64. ЗАБОР ОБРАЗЦОВ КРОВИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МАССОВОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ НЕДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ НА НАСЛЕДСТВЕННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЧЕРЕЗ 3 ЧАСА ПОСЛЕ КОРМЛЕНИЯ _____ СУТКИ ЖИЗНИ

- 1)+ на седьмые
- 2) на четвертые
- 3) в первые
- 4) на вторые

65. ЛЕЧЕНИЕ НОВОРОЖДЕННЫХ С ПРИЗНАКАМИ ИНФЕКЦИИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ

- 1)+ в отделении патологии новорожденных
- 2) в обсервационном отделении
- 3) в палате для совместного пребывания послеродового отделения
- 4) в палате для раздельного пребывания послеродового отделения

66. К РОДОВОЙ ТРАВМЕ ОТНОСЯТ

- 1)+ кефалогематому
- 2) гемолитическую болезнь новорожденного
- 3) бронхолегочную дисплазию
- 4) физиологическую эритему

67. ОДНИМ ИЗ СИМПТОМОВ ГИПОГАЛАКТИИ СО СТОРОНЫ НОВОРОЖДЕННОГО ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ уменьшение суточного объема мочи
- 2) жидкий стул
- 3) спокойный сон
- 4) нормальная прибавка массы тела

68. ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ ПЛАВАЮЩЕЕ ДВИЖЕНИЕ ГЛАЗНЫХ ЯБЛОК У НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ НАЗЫВАЕТСЯ

- 1)+ нистагм
- 2) астигматизм
- 3) анизокория
- 4) экзофтальм

69. ХАРАКТЕРНОЙ ОСОБЕННОСТЬЮ МЫШЕЧНОЙ СИСТЕМЫ НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ мышечная гипотония
- 2) обычный мышечный тонус
- 3) гипертонус мышц сгибателей
- 4) гипертонус мышц разгибателей

70. ВМЕСТИМОСТЬ ЖЕЛУДКА В ПЕРВЫЕ 10 ДНЕЙ У НЕДОНОШЕННОГО РЕБЕНКА СОСТАВЛЯЕТ _____ МЛ/КГ, УМНОЖЕННЫЕ НА КОЛИЧЕСТВО ДНЕЙ

- 1)+ 3
- 2) 1
- 3) 5
- 4) 7

71. ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ БРОНХОЛЕГОЧНОЙ ДИСПЛАЗИИ НОВОРОЖДЕННЫМ С ОЧЕНЬ НИЗКОЙ МАССОЙ ТЕЛА, НАХОДЯЩИМСЯ НА ИВЛ БОЛЕЕ 7 СУТОК ЖИЗНИ, ПОКАЗАНО НАЗНАЧЕНИЕ

- 1)+ дексаметазона
- 2) эпинефрина
- 3) натрия хлорида
- 4) кофеин-бензоат натрия

72. ПРИБОР ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ СЛУХА У НОВОРОЖДЕННОГО ПРИ ПРОВЕДЕНИИ АУДИОЛОГИЧЕСКОГО СКРИНИНГА РАСПОЛАГАЕТСЯ НА РАССТОЯНИИ ____ САНТИМЕТРОВ ОТ УХА

- 1)+ 10
- 2) 5
- 3) 15
- 4) 20

73. ПОЛОЖЕНИЕ НОВОРОЖДЕННОГО С ОЧЕНЬ НИЗКОЙ МАССОЙ ТЕЛА РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИЗМЕНЯТЬ КАЖДЫЕ ____ (ЧАС)

- 1)+ 3
- 2) 2
- 3) 4
- 4) 6

74. РАСШИРЕННЫЙ НЕОНАТАЛЬНЫЙ СКРИНИНГ НА ВРОЖДЕННЫЕ И (ИЛИ) НАСЛЕДСТВЕННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ПРОВОДИТСЯ НА СЛЕДУЮЩЕЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ

- 1)+ болезнь "кленового сиропа"
- 2) муковисцидоз
- 3) врожденный гипотиреоз
- 4) галактоземия

75. В СОСТАВ ТРАВЯНОГО ЛАКТОГЕННОГО ЧАЯ ВХОДИТ

- 1)+ мелисса
- 2) зверобой
- 3) подорожник
- 4) ландыш

76. ИССЛЕДОВАНИЕ СЛУХА У НОВОРОЖДЕННОГО ПРИ ПРОВЕДЕНИИ АУДИОЛОГИЧЕСКОГО СКРИНИНГА ПРОВОДИТСЯ ЧЕРЕЗ ____ (ЧАС) ПОСЛЕ КОРМЛЕНИЯ

- 1)+ 1
- 2) 2
- 3) 3
- 4) 4

77. ДЛЯ ЛАБОРАТОРНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ОБРАЗЦОВ КРОВИ НОВОРОЖДЕННЫХ В РАМКАХ РАСШИРЕННОГО НЕОНАТАЛЬНОГО СКРИНИНГА НА ВРОЖДЕННЫЕ И (ИЛИ) НАСЛЕДСТВЕННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ТЕСТ-БЛАНКИ С ____ ПЯТНАМИ КРОВИ.

- 1)+ 3
- 2) 5
- 3) 8
- 4) 2

78. В ПЕРЕЧЕНЬ МЕДИЦИНСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПЕРВИЧНОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ НОВОРОЖДЕННЫХ С ОЧЕНЬ НИЗКОЙ МАССОЙ ТЕЛА В ПЕРВЫЕ 48 Ч ЖИЗНИ ВХОДИТ КОНТРОЛЬ УРОВНЯ

- 1)+ глюкозы
- 2) билирубина
- 3) креатинина
- 4) натрия

79. СТАТИСТИЧЕСКОМУ УЧЕТУ ПОДЛЕЖАТ ВСЕ НОВОРОЖДЕННЫЕ, РОДИВШИЕСЯ С МАССОЙ ОТ ____ ГРАММ ПРИ ДОСТИЖЕНИИ ИМИ 168 Ч ЖИЗНИ

- 1)+ 500
- 2) 400
- 3) 750
- 4) 1000

80. ПРЕПАРАТ СУРФАКТАНТА ВВОДЯТ ИЗ РАСЧЕТА ____ МГ НА КГ ВЕСА НОВОРОЖДЕННОГО

- 1)+ 200
- 2) 250
- 3) 300
- 4) 350

81. У ЗДОРОВОГО ДОНОШЕННОГО НОВОРОЖДЕННОГО ОКРУЖНОСТЬ ГРУДИ СОСТАВЛЯЕТ В СРЕДНЕМ ____ САНТИМЕТРОВ

- 1)+ 32-34
- 2) 38-40
- 3) 28-30
- 4) 26-28

82. ОДНИМ ИЗ ФАКТОРОВ РИСКА РАЗВИТИЯ ТУГОУХОСТИ У НОВОРОЖДЕННОГО ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ асфиксия новорожденного
- 2) компенсированная гипертензия у матери
- 3) анемия легкой степени у матери
- 4) многоплодная беременность

83. ОДНИМ ИЗ ПРИЗНАКОВ ЖИВОРОЖДЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ пульсация пуповины
- 2) цианоз кожных покровов
- 3) гиперемия кожных покровов
- 4) высокий мышечный тонус

84. МЕСТОМ РАЗМЕЩЕНИЯ СОБРАННЫХ ОБРАЗЦОВ КРОВИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ НЕОНАТАЛЬНОГО СКРИНИНГА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ бумажный тест-бланк
- 2) пробирка
- 3) предметное стекло
- 4) капилляр

85. РАСШИРЕННЫЙ ОБЪЕМ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ГИПОТЕРМИИ ПРОВОДИТСЯ НЕДОНОШЕННЫМ НОВОРОЖДЕННЫМ ПРИ ГЕСТАЦИОННОМ ВОЗРАСТЕ МЕНЕЕ ____ НЕДЕЛЬ

- 1)+ 28
- 2) 25
- 3) 26
- 4) 24

86. ИЗОТОНИЧЕСКИЙ РАСТВОР НАТРИЯ ХЛОРИДА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПЕРВИЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ НОВОРОЖДЕННОМУ ВВОДИТСЯ ВНУТРИВЕННО ИЗ РАСЧЕТА ____ МЛ НА КГ ВЕСА

- 1)+ 10
- 2) 5
- 3) 15
- 4) 20

87. ХОЛОДОВОЙ СТРЕСС У ДОНОШЕННОГО НОВОРОЖДЕННОГО НАЧИНАЕТСЯ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ТЕЛА МЕНЕЕ ____ ГРАДУСОВ ЦЕЛЬСИЯ

- 1)+ 36,5
- 2) 36,7
- 3) 36,8
- 4) 36,9

88. ОСНОВНЫМ ПОКАЗАТЕЛЕМ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИВЛ У ГЛУБОКО НЕДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ ЯВЛЯЕТСЯ ВОЗРАСТАНИЕ ЧСС БОЛЕЕ _____ УДАРОВ В МИН.

- 1)+ 100
- 2) 70
- 3) 90
- 4) 140

89. К ПРЕПАРАТАМ СУРФАКТАНТА ОТНОСИТСЯ

- 1)+ порактант альфа
- 2) эпинефрин
- 3) дексаметазон
- 4) преднизолон

90. У ЗДОРОВОГО ДОНОШЕННОГО НОВОРОЖДЕННОГО ОКРУЖНОСТЬ ГОЛОВЫ СОСТАВЛЯЕТ В СРЕДНЕМ _____ САНТИМЕТРОВ

- 1)+ 34-36
- 2) 40-42
- 3) 30-32
- 4) 28-30

91. МЕСТОМ ПРИСОЕДИНЕНИЯ ДАТЧИКА ПУЛЬСОКСИМЕТРА НОВОРОЖДЕННОМУ С ОЧЕНЬ НИЗКОЙ МАССОЙ ТЕЛА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ правое запястье
- 2) правая щиколотка
- 3) левое запястье
- 4) левая щиколотка

92. ДЛЯ ЛАБОРАТОРНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ОБРАЗЦОВ КРОВИ НОВОРОЖДЕННЫХ В РАМКАХ НЕОНАТАЛЬНОГО СКРИНИНГА НА ВРОЖДЕННЫЕ И (ИЛИ) НАСЛЕДСТВЕННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ТЕСТ-БЛАНКИ С _____ ПЯТНАМИ КРОВИ

- 1)+ 5
- 2) 3
- 3) 8
- 4) 9

93. ИССЛЕДОВАНИЕ ОБРАЗЦОВ КРОВИ В ЛАБОРАТОРИИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ НЕОНАТАЛЬНОГО СКРИНИНГА СОСТАВЛЯЕТ НЕ БОЛЕЕ _____ С МОМЕНТА ПОСТУПЛЕНИЯ ТЕСТ-БЛАНКОВ

- 1)+ 72 часов
- 2) 24 часов
- 3) 10 дней
- 4) 5 дней

94. ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ОСОБЕННОСТЬЮ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА НЕДОНОШЕННОГО НОВОРОЖДЕННОГО ЯВЛЯЕТСЯ ПЛОХОЕ ПЕРЕВАРИВАНИЕ

- 1)+ жира
- 2) белка
- 3) лактозы
- 4) глюкозы

95. НЕДОНОШЕННЫЙ НОВОРОЖДЕННЫЙ МОЖЕТ БЫТЬ ВЫПИСАН ПРИ ДОСТИЖЕНИИ ИМ МАССЫ _____ ГРАММ

- 1)+ 2500
- 2) 2000
- 3) 3000
- 4) 3500

96. ОДНОЙ ИЗ ПРИЧИН РАЗВИТИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ ВНУТРИУТРОБНОЙ ГИПОКСИИ (СО СТОРОНЫ ПЛОДА) ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ врожденные пороки развития
- 2) патология плаценты
- 3) выпадение петель пуповины
- 4) предлежание плаценты

97. ПРИЗНАКОМ ТРАВМЫ ВЕРХНЕШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА У НОВОРОЖДЕННОГО ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ поперхивание при глотании
- 2) вялое свисание руки
- 3) отсутствие движения в одной кисти
- 4) спазм мышц нижних конечностей

98. СИНДРОМ АРЛЕКИНА У НЕДОНОШЕННОГО НОВОРОЖДЕННОГО ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЗНАКОМ

- 1)+ нарушения микроциркуляции
- 2) снижения терморегуляции
- 3) нарушения функции ЦНС
- 4) мышечной гипотонии

99. ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ЖЕЛТУХА НОВОРОЖДЕННОГО ПОЯВЛЯЕТСЯ НА _____ ДЕНЬ ЖИЗНИ

- 1)+ 3
- 2) 1
- 3) 10
- 4) 8

100. МЕТОДИКА НЕПРЕРЫВНОГО ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ В ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЯХ В КАЧЕСТВЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО МЕТОДА РЕСПИРАТОРНОЙ ПОДДЕРЖКИ НОВОРОЖДЕННОГО С ОЧЕНЬ НИЗКОЙ МАССОЙ ТЕЛА ПРИМЕНЯЕТСЯ В СЛУЧАЕ

- 1)+ гестационного возраста 27-32 недели
- 2) частоты сердечных сокращений менее 100 в мин
- 3) отсутствия регулярного спонтанного дыхания
- 4) частоты сердечных сокращений менее 60 в мин

101. ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ ГРУДИННО-КЛЮЧИЧНО-СОСЦЕВИДНОЙ МЫШЦЫ ГОЛОВА НОВОРОЖДЕННОГО НАКЛОНЕНА

- 1)+ в больную сторону
- 2) в здоровую сторону
- 3) вперед
- 4) назад

102. К ТРАНЗИТОРНЫМ СОСТОЯНИЯМ НОВОРОЖДЕННЫХ ОТНОСИТСЯ

- 1)+ гормональный криз
- 2) муковисцидоз
- 3) фенилкетонурия
- 4) пузырчатка новорожденных

103. У НЕДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ ДЛЯ ФИКСАЦИИ ЭЛЕКТРОДОВ, КАТЕТЕРОВ ЗАПРЕЩЕНО ПРИМЕНЕНИЕ

- 1)+ лейкопластыря
- 2) пектинового барьера
- 3) гидрогеля
- 4) гидроколлоидного покрытия

104. МАКСИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА ПРИ ВНУТРИМЫШЕЧНОМ ВВЕДЕНИИ НЕДОНОШЕННОМУ НОВОРОЖДЕННОМУ С МАССОЙ ТЕЛА МЕНЕЕ 1500 ГРАММ СОСТАВЛЯЕТ _____ МЛ

- 1)+ 0,5
- 2) 1
- 3) 2
- 4) 0,1

105. У НОВОРОЖДЕННОГО С ТЯЖЕЛОЙ АСФИКСИЕЙ КОЖНЫЕ ПОКРОВЫ

- 1)+ цианотичные
- 2) гиперемированы
- 3) бледные
- 4) розовые

106. ТЕМПЕРАТУРА ТЕЛА У ЗДОРОВОГО ДОНОШЕННОГО НОВОРОЖДЕННОГО СТАБИЛИЗИРУЕТСЯ К _____ ЧАСУ ЖИЗНИ

- 1)+ 5-6
- 2) 1-2
- 3) 3-4
- 4) 10-12

Тема 3. Первичная доврачебная медико-санитарная помощь детям различного возраста.

1. В СИСТЕМЕ "ХОЛОДОВОЙ ЦЕПИ" СЛЕДУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТЕРМОРЕГИСТРАТОРЫ, ФИКСИРУЮЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ С ИНТЕРВАЛОМ ВРЕМЕНИ МЕЖДУ СОСЕДНИМИ ИЗМЕРЕНИЯМИ НЕ БОЛЕЕ ____ (МИНУТ)

- 1)+ 1
- 2) 10
- 3) 5
- 4) 2

2. ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ДОЗА ВИТАМИНА Д ДЛЯ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ОТ 6 ДО 12 МЕСЯЦЕВ СОСТАВЛЯЕТ ____ МЕ В СУТКИ

- 1)+ 1000
- 2) 200
- 3) 800
- 4) 1500

3. ТЕМПЕРАТУРУ В ХОЛОДИЛЬНИКЕ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ КОНТРОЛИРУЮТ И ФИКСИРУЮТ В СПЕЦИАЛЬНОМ ЖУРНАЛЕ

- 1)+ два раза в день
- 2) один раз в день
- 3) каждые 3 часа
- 4) каждые 2 часа

4. НЕОБОСНОВАННОЕ НАЗНАЧЕНИЕ БОЛЬШОГО КОЛИЧЕСТВА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ДЕТАМ НАЗЫВАЕТСЯ

- 1)+ полипрагмазия
- 2) синергизм
- 3) кумуляция
- 4) антагонизм

5. СМЕНА МОЛОЧНЫХ ЗУБОВ НА ПОСТОЯННЫЕ НАЧИНАЕТСЯ У РЕБЕНКА В ВОЗРАСТЕ ____ (ЛЕТ)

- 1)+ 5–7
- 2) 7–10
- 3) 10–13
- 4) 2–5

6. ПЕРВАЯ ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ ДИФТЕРИИ, КОКЛЮША, СТОЛЬНЯКА ПРОВОДИТСЯ ДЕТАМ В ВОЗРАСТЕ

- 1)+ трех месяцев
- 2) одного месяца
- 3) шести месяцев
- 4) одного года

7. ФАКТОРОМ РИСКА РАЗВИТИЯ МЕЛАНОМЫ КОЖИ У ДЕТЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ избыточная инсоляция
- 2) нерациональное питание
- 3) избыточная масса тела
- 4) гиподинамия

8. ЧАСТОТА ДЫХАТЕЛЬНЫХ ДВИЖЕНИЙ У ЗДОРОВОГО РЕБЕНКА В 5 ЛЕТ СОСТАВЛЯЕТ ____ В МИНУТУ

- 1)+ 20-25
- 2) 16-18
- 3) 30-35
- 4) 40-60

9. ЗА ПЕРВЫЙ МЕСЯЦ ЖИЗНИ ЗДОРОВЫЙ НОВОРОЖДЕННЫЙ ДОЛЖЕН ПРИБАВИТЬ В ВЕСЕ НЕ МЕНЕЕ _____ ГРАММ

- 1)+ 600
- 2) 200
- 3) 400
- 4) 300

10. ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАРУШЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА ХРАНЕНИЯ ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ПРИМЕНЯЮТ

- 1)+ термоиндикаторы
- 2) термометры
- 3) терморегистраторы
- 4) термографы

11. СРЕДНЯЯ ЧАСТОТА СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ У ЗДОРОВОГО РЕБЕНКА 10 ЛЕТ СОСТАВЛЯЕТ _____ УДАРОВ В МИНУТУ

- 1)+ 85
- 2) 100
- 3) 90
- 4) 70

12. ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ ПРИВИВКИ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА-ВАКЦИНАТОР

- 1)+ сверяет наименование препарата на ампуле с назначением врача
- 2) проводит осмотр ребенка
- 3) делает заключение о возможности вакцинации
- 4) организует работу иммунологической комиссии

13. СЕАНС МАССАЖА ЗДОРОВОМУ РЕБЕНКУ НАЧИНАЕТСЯ С

- 1)+ поглаживания
- 2) разминания
- 3) растирания
- 4) вибрации

14. ДАННЫЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ОСМОТРА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ВНОСЯТСЯ В УЧЕТНУЮ ФОРМУ

- 1)+ 030-ПО/у-17
- 2) 030-ПО/о-17
- 3) 030-ПО/у-12
- 4) 030-ПО/о-12

15. ПАТРОНАЖ К НОВОРОЖДЕННОМУ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ

- 1)+ 1 раз в неделю
- 2) 1 раз в день
- 3) 1 раз в месяц
- 4) 2 раза в месяц

16. В КАЧЕСТВЕ ПЕРВОГО ПРИКОРМА ДЛЯ РЕБЕНКА С НОРМАЛЬНЫМ ВЕСОМ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЕЕ НАЗНАЧАТЬ

- 1)+ овощное пюре
- 2) творог
- 3) молочную кашу
- 4) кефир

17. КАБИНЕТ ОКАЗАНИЯ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ, НАХОДЯЩИМСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ, СОЗДАЕТСЯ НА БАЗЕ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОКАЗЫВАЮЩЕЙ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ

- 1)+ первичную медико-санитарную
- 2) скорую
- 3) специализированную
- 4) паллиативную

18. РЕВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ ПНЕВМОКОККОВОЙ ИНФЕКЦИИ ПРОВОДИТСЯ ДЕТЯМ В ВОЗРАСТЕ _____ МЕСЯЦЕВ

- 1)+ 15
- 2) 9
- 3) 18
- 4) 12

19. МАССА ТЕЛА РЕБЕНКА В ВОЗРАСТЕ ОДИН ГОД В СРЕДНЕМ СОСТАВЛЯЕТ _____ КГ

- 1)+ 10-11
- 2) 19-20
- 3) 14-15
- 4) 7-8

20. КО 2 ГРУППЕ ЗДОРОВЬЯ ОТНОСЯТСЯ НОВОРОЖДЕННЫЕ

- 1)+ с риском развития заболеваний
- 2) недоношенные
- 3) с пренатальной гипотрофией 2 степени
- 4) с гемолитической болезнью

21. ОСМОТР НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ НА ПЕДИКУЛЕЗ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ОРГАНИЗОВАННОГО ОТДЫХА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ СМЕНЫ И НЕ РЕЖЕ 1 РАЗА В _____ ДНЕЙ

- 1)+ 7
- 2) 14
- 3) 5
- 4) 10

22. ЗДОРОВОГО ДОНОШЕННОГО РЕБЕНКА В ВОЗРАСТЕ ТРЕХ МЕСЯЦЕВ КУПАЮТ

- 1)+ ежедневно
- 2) через день
- 3) один раз в три дня
- 4) один раз в неделю

23. СУТОЧНЫЙ ОБЪЕМ ПИТАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ 6 МЕСЯЦЕВ СОСТАВЛЯЕТ __ МЛ

- 1)+ 1000
- 2) 500
- 3) 1500
- 4) 200

24. ВЛАЖНАЯ УБОРКА КАБИНЕТА ИММУНОПРОФИЛАКТИКИ ПРОВОДИТСЯ

- 1)+ два раза в день
- 2) один раз в день
- 3) через день
- 4) один раз в неделю

25. РАХИТ У РЕБЕНКА РАЗВИВАЕТСЯ ПРИ НЕДОСТАТКЕ ВИТАМИНА

- 1)+ Д
- 2) А
- 3) В
- 4) С

26. ВАКЦИНЫ В ТЕЧЕНИЕ РАБОЧЕГО ДНЯ ПРИВИВОЧНОЙ БРИГАДЫ ХРАНЯТСЯ

- 1)+ в специальном холодильнике
- 2) на процедурном столе
- 3) в шкафу процедурного кабинета
- 4) в обычной медицинской сумке

27. ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДИСПАНСЕРНОГО НАБЛЮДЕНИЯ ДЕТЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ достижение стойкой компенсации физиологических функций после перенесенного острого заболевания
- 2) обострение хронического заболевания не чаще 1 раза в год
- 3) достижение частичной компенсации физиологических функций хронического заболевания
- 4) обострение хронического заболевания не чаще 2 раз в год

28. НЕОБХОДИМЫМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ УСЛОВИЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ОСМОТРА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ дача информированного добровольного согласия родителей или законного представителя
- 2) измерение роста и веса
- 3) оплата медицинских вмешательств
- 4) проведение пробы манту или диаскин теста

29. ВТОРОЙ УРОВЕНЬ ОКАЗАНИЯ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ, НАХОДЯЩИМСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ ПРЕДСТАВЛЕН

- 1)+ межмуниципальными отделениями медико-социальной помощи
- 2) отделениями медико-социальной помощи
- 3) кабинетами медико-социальной помощи
- 4) региональным центром медико-социальной помощи

30. ДЛЯ ОЦЕНКИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ПРИМЕНЯЮТ

- 1)+ перцентильные диаграммы
- 2) индекс массы тела
- 3) круговые диаграммы
- 4) индекс Брока

31. ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ГЛИСТНУЮ ИНВАЗИЮ _____, ПРОВОДЯТ СОСКОБ С ПЕРИАНАЛЬНЫХ СКЛАДОК

- 1)+ энтеробиоз
- 2) аскаридоз
- 3) трихоцефалез
- 4) эхинококкоз

32. НА ЧЕТВЕРТОМ УРОВНЕ «ХОЛОДОВОЙ ЦЕПИ» ВСЕ ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ ДОЛЖНЫ ХРАНИТЬСЯ В ХОЛОДИЛЬНИКЕ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ В ПРЕДЕЛАХ ОТ ____ °С ДО ____ °С ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

- 1)+ +2 +8
- 2) +6 +10
- 3) +8 +12
- 4) -1 0

33. ВТОРОЙ ДОРОДОВЫЙ ПАТРОНАЖ ПРОВОДИТСЯ НА СРОКЕ БЕРЕМЕННОСТИ ____ (НЕДЕЛЬ)

- 1)+ 30-32
- 2) 22-24
- 3) 38-40
- 4) 26-28

34. ЗДОРОВЫЙ РЕБЕНОК САМОСТОЯТЕЛЬНО СИДИТ С ВОЗРАСТА ____ МЕСЯЦЕВ

- 1)+ 6
- 2) 4
- 3) 8
- 4) 12

35. К КОНЦУ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ У ЗДОРОВОГО РЕБЕНКА ДОЛЖНО БЫТЬ ____ ЗУБОВ

- 1)+ 8
- 2) 4
- 3) 6
- 4) 12

36. К ТРЕТЬЕЙ ГРУППЕ ЗДОРОВЬЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ОСМОТРА ОТНОСЯТСЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ

- 1)+ страдающие хроническими заболеваниями в стадии клинической ремиссии
- 2) здоровые несовершеннолетние, имеющие нормальное физическое и психическое развитие
- 3) реконвалесценты, перенесшие тяжелые инфекционные заболевания
- 4) с физическими недостатками с выраженным нарушением функций органов и систем

37. КОЛИЧЕСТВО МОЛОЧНЫХ ЗУБОВ У РЕБЕНКА 1 ГОДА

- 1)+ 8
- 2) 4
- 3) 6
- 4) 10

38. МЕДИЦИНСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ПРИВИТЫМ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В ТЕЧЕНИЕ ____ МИНУТ

- 1)+ 30
- 2) 5
- 3) 15
- 4) 40

39. НОРМОЙ ДЛЯ РЕБЕНКА В ВОЗРАСТЕ 7 ДНЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ длительный сон
- 2) длительное бодрствование
- 3) мышечная гипотония
- 4) обильное (более 40 мл) срыгивание после каждого кормления

40. ДО ДВУХЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА У РЕБЕНКА ОТМЕЧАЕТСЯ ____ ДЫХАНИЕ

- 1)+ диафрагмальное
- 2) грудное
- 3) брюшное
- 4) диафрагмально-грудное

41. ГИПЕРТОНУС МЫШЦ-СГИБАТЕЛЕЙ СОХРАНЯЕТСЯ У ЗДОРОВОГО ДОНОШЕННОГО НОВОРОЖДЕННОГО ДО ВОЗРАСТА ____ (МЕСЯЦ)

- 1)+ 3
- 2) 1
- 3) 4
- 4) 6

42. ДОПУСТИМАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В СПАЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ СТАЦИОНАРНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ СОСТАВЛЯЕТ НЕ НИЖЕ ____ ГРАДУСОВ ЦЕЛЬСИЯ

- 1)+ 18
- 2) 16
- 3) 26
- 4) 24

43. ЗДОРОВОМУ РЕБЕНКУ В ВОЗРАСТЕ 3 МЕСЯЦЕВ ПРОВОДИТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ _____

- 1)+ травматолога-ортопеда
- 2) детского невролога
- 3) эндокринолога
- 4) детского стоматолога

44. ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ ДЛЯ ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ВАННЫ НОВОРОЖДЕННОГО СОСТАВЛЯЕТ ____ ГРАДУСОВ ЦЕЛЬСИЯ

- 1)+ 37
- 2) 40
- 3) 30
- 4) 25

45. ДЛЯ НОРМАЛЬНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ РЕБЕНКА НЕОБХОДИМО ДОСТАТОЧНОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ _____ С ПИЩЕЙ

- 1)+ йода
- 2) фтора
- 3) кальция
- 4) натрия

46. ПЕРВЫЙ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ПРИЕМ В ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКЕ ПРОВОДИТСЯ РЕБЕНКУ В ВОЗРАСТЕ ____ (МЕСЯЦ)

- 1)+ 1
- 2) 2
- 3) 3
- 4) 4

47. ЧИСЛО ДЫХАТЕЛЬНЫХ ДВИЖЕНИЙ У ДЕТЕЙ 1 ГОДА В ОДНУ МИНУТУ В НОРМЕ СОСТАВЛЯЕТ

- 1)+ 30-35
- 2) 16-18
- 3) 20-25
- 4) 40-60

48. ЗДОРОВОМУ НОВОРОЖДЕННОМУ В ВОЗРАСТЕ ОДНОГО МЕСЯЦА ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВОДИТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА

- 1)+ невролога
- 2) травматолога
- 3) оториноларинголога
- 4) психиатра

49. БОЛЬШОЙ РОДНИЧОК У ЗДОРОВОГО РЕБЕНКА ЗАКРЫВАЕТСЯ В ВОЗРАСТЕ ____ МЕСЯЦЕВ

- 1)+ 12-15
- 2) 10-11
- 3) 15-18
- 4) 18-24

50. ЗИМНИЕ ПРОГУЛКИ С НОВОРОЖДЕННЫМ ДОПУСТИМЫ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА НЕ НИЖЕ ____ ГРАДУСОВ ЦЕЛЬСИЯ

- 1)+ -10
- 2) -15
- 3) 0
- 4) -20

51. СВЕДЕНИЯ О ДИСПАНСЕРНОМ НАБЛЮДЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ВНОСЯТСЯ В УЧЕТНУЮ ФОРМУ

- 1)+ 030/y
- 2) 030-ПО/y-17
- 3) 030-ПО/0-17
- 4) 030-ПО/y-13

52. МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ПЕДИАТРИЧЕСКОГО УЧАСТКА ПОСЕЩАЕТ ЗДОРОВОГО ДОНОШЕННОГО РЕБЕНКА В ПЕРВЫЙ МЕСЯЦ ЖИЗНИ НЕ МЕНЕЕ ____ РАЗ

- 1)+ 4
- 2) 2
- 3) 3
- 4) 8

53. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ИСПОЛЬЗУЮТ

- 1)+ весы
- 2) секундомер
- 3) динамометр
- 4) шагомер

54. ПРИ ИЗМЕРЕНИИ ОКРУЖНОСТИ ГОЛОВЫ ГРУДНОГО РЕБЕНКА МЯГКАЯ САНТИМЕТРОВАЯ ЛЕНТА СЗАДИ ДОЛЖНА ПРОХОДИТЬ

- 1)+ через наиболее выступающую часть затылка
- 2) под затылком
- 3) чуть выше затылка
- 4) чуть ниже теменных бугров

55. ОДНИМ ИЗ ОСЛОЖНЕНИЙ ВВЕДЕНИЯ ВАКЦИНЫ БЦЖ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ регионарный лимфаденит
- 2) артрит
- 3) тромбоцитопения
- 4) энцефалит

56. УЧЕТНАЯ ФОРМА "КАРТА ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО" ЗАПОЛНЯЕТСЯ НЕ ПОЗДНЕЕ ____ РАБОЧИХ ДНЕЙ С ДАТЫ ОКОНЧАНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ОСМОТРА

- 1)+ 20
- 2) 5
- 3) 10
- 4) 30

57. ВАКЦИНАЦИЯ И ПОСЛЕДУЮЩИЕ РЕВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ ПОЛИОМИЕЛИТА ДЕТЯМ, ОТНОСЯЩИМСЯ К ГРУППАМ РИСКА ПРОВОДИТСЯ ВАКЦИНОЙ

- 1)+ инактивированной
- 2) живой
- 3) комбинированной
- 4) ассоциированной

58. СОГЛАСНО НАЦИОНАЛЬНОМУ КАЛЕНДАРЮ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК, ДЕТЯМ В ВОЗРАСТЕ 6 ЛЕТ ПРОВОДИТСЯ

- 1)+ ревакцинация против кори, краснухи, эпидемического паротита
- 2) третья ревакцинация против дифтерии, столбняка
- 3) вторая ревакцинация против дифтерии, столбняка
- 4) третья ревакцинация против полиомиелита

59. ДЕТЯМ, ИЗ ГРУППЫ РИСКА (РОДИВШИМСЯ ОТ МАТЕРЕЙ, НЕ ИМЕЮЩИХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБСЛЕДОВАНИЯ НА МАРКЕРЫ ГЕПАТИТА В) ТРЕТЬЯ ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА В ПРОВОДИТСЯ В ВОЗРАСТЕ ____ (МЕСЯЦ)

- 1)+ 2
- 2) 6
- 3) 12
- 4) 4

60. МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ПЕДИАТРИЧЕСКОГО УЧАСТКА ПОСЕЩАЕТ РЕБЕНКА С РИСКОМ РАЗВИТИЯ ПАТОЛОГИИ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ СО ВТОРОГО МЕСЯЦА ЖИЗНИ

- 1)+ 1 раз в месяц
- 2) еженедельно
- 3) два раза в месяц
- 4) раз в три месяца

61. НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ, С НАРУШЕНИЯМИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ТРЕБУЮЩИМИ ОГРАНИЧЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК, ОТНОСЯТСЯ К ГРУППЕ ПО ЗАНЯТИЮ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ

- 1)+ 3А
- 2) 3Б
- 3) 2
- 4) 1

62. НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ, СТРАДАЮЩИЕ ТЯЖЕЛЫМИ ХРОНИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ С ВЫРАЖЕННОЙ ДЕКОМПЕНСАЦИЕЙ ФУНКЦИЙ ОРГАНОВ И СИСТЕМ ОРГАНИЗМА ОТНОСЯТСЯ К ____ ГРУППЕ ЗДОРОВЬЯ

- 1)+ 5
- 2) 2
- 3) 4
- 4) 3

63. К ГРУППЕ РИСКА ПО РАЗВИТИЮ ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОТНОСЯТСЯ НОВОРОЖДЕННЫЕ, ПЕРЕНЕСШИЕ

- 1)+ асфиксию в родах
- 2) физиологическую желтуху
- 3) гормональный криз
- 4) физиологическую эритему

64. ФАКТОРОМ РИСКА РАЗВИТИЯ АТОПИЧЕСКОГО ДЕРМАТИТА У ДЕТЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ наследственность
- 2) инфекционное заболевание
- 3) инсоляция
- 4) переохлаждение

65. ПЕРВАЯ РЕВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ ПОЛИОМИЕЛИТА ЗДОРОВЫМ ДЕТЯМ ПРОВОДИТСЯ В ВОЗРАСТЕ _____ МЕСЯЦЕВ

- 1)+ 18
- 2) 15
- 3) 12
- 4) 20

66. РЕВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ ПНЕВМОКОККОВОЙ ИНФЕКЦИИ ПРОВОДИТСЯ В ВОЗРАСТЕ ____ МЕСЯЦЕВ

- 1)+ 15
- 2) 12
- 3) 18
- 4) 20

67. ТРЕТЬЯ ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА В ЗДОРОВЫМ ДЕТЯМ ПРОВОДИТСЯ В ВОЗРАСТЕ _____ МЕСЯЦЕВ

- 1)+ 6
- 2) 4
- 3) 8
- 4) 12

68. СОГЛАСНО НАЦИОНАЛЬНОМУ КАЛЕНДАРЮ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК, ДЕТЯМ В ВОЗРАСТЕ 14 ЛЕТ ПРОВОДИТСЯ

- 1)+ третья ревакцинация против дифтерии, столбняка
- 2) вторая ревакцинация против дифтерии, столбняка
- 3) ревакцинация против кори, краснухи, эпидемического паротита
- 4) ревакцинация против туберкулеза

69. ПРОВЕРКА ОСТРОТЫ ЗРЕНИЯ ПРИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОМ ОСМОТРЕ ВПЕРВЫЕ ПРОВОДИТСЯ В ВОЗРАСТЕ _____ ЛЕТ

- 1)+ 3
- 2) 6
- 3) 5
- 4) 14

70. ЗУД В ПЕРИАНАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЗНАКОМ

- 1)+ энтеробиоза
- 2) описторхоза
- 3) аскаридоза
- 4) трихоцефалеза

71. В ПЕРИОД КОРМЛЕНИЯ ГРУДЬЮ ЖЕНЩИНЕ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ УПОТРЕБЛЯТЬ В ПИЩУ

- 1)+ чеснок
- 2) молоко
- 3) говядину
- 4) яблоки

72. АКТИВНЫЙ ЕСТЕСТВЕННЫЙ ИММУНИТЕТ ФОРМИРУЕТСЯ ПОСЛЕ

- 1)+ перенесенного инфекционного заболевания
- 2) приёма препаратов интерферона
- 3) вакцинации
- 4) введения иммуноглобулина

73. НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ, СТРАДАЮЩИЕ ТЯЖЕЛЫМИ ХРОНИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ С ВЫРАЖЕННОЙ ДЕКОМПЕНСАЦИЕЙ ФУНКЦИЙ ОРГАНОВ И СИСТЕМ ОРГАНИЗМА, ТРЕБУЮЩИМИ НАЗНАЧЕНИЯ ПОСТОЯННОГО ЛЕЧЕНИЯ, ОТНОСЯТСЯ К ____ ГРУППЕ ЗДОРОВЬЯ

- 1)+ V
- 2) III
- 3) IV
- 4) II

74. К ПОСТВАКЦИНАЛЬНЫМ ОСЛОЖНЕНИЯМ ОТНОСИТСЯ ОСТРЫЙ

- 1)+ миокардит
- 2) бронхит
- 3) фарингит
- 4) ларингит

75. ОБУЧЕНИЕ ГИГИЕНИЧЕСКИМ НАВЫКАМ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ 2-3 ЛЕТ СТРОИТСЯ В ВИДЕ

- 1)+ игры
- 2) лекции
- 3) беседы
- 4) урока

76. ИНКУБАЦИОННЫЙ ПЕРИОД ПРИ КОРИ ДЛИТСЯ ____ (ДЕНЬ)

- 1)+ 7-21
- 2) 5-7
- 3) 5-14
- 4) 35-36

77. ВНУТРИКОЖНАЯ АЛЛЕРГИЧЕСКАЯ ПРОБА С ТУБЕРКУЛИНОМ ПРОВОДИТСЯ

- 1)+ ежегодно
- 2) один раз в три года
- 3) один раз в 2 года
- 4) ежеквартально

78. АБСОЛЮТНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ РЕБЕНКА ГРУДНЫМ МОЛОКОМ ЯВЛЯЕТСЯ ИНФИЦИРОВАНИЕ МАТЕРИ ВИРУСОМ

- 1)+ иммунодефицита человека
- 2) коревой краснухи
- 3) ветряной оспы
- 4) эпидемического паротита

79. ЗДОРОВЫЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ, ИМЕЮЩИЕ НЕКОТОРЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ НАРУШЕНИЯ, ОТНОСЯТСЯ К ____ ГРУППЕ ЗДОРОВЬЯ

- 1)+ 2
- 2) 1
- 3) 3
- 4) 5

80. ПРИ УГРОЗЕ СТЕНОЗА ГОРТАНИ У РЕБЕНКА С ЛАРИНГОТРАХЕИТОМ ВНЕ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЕТСЯ

- 1)+ срочная госпитализация
- 2) направление в поликлинику
- 3) проведение оксигенотерапии
- 4) выполнение физиотерапевтических процедур

81. В ОТДЕЛЬНОМ ПОМЕЩЕНИИ ПРОВОДЯТ ВАКЦИНАЦИЮ ПРОТИВ

- 1)+ туберкулеза
- 2) кори
- 3) полиомиелита
- 4) дифтерии

82. В ПЕРИОД ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ОСМОТРА ЗДОРОВОГО РЕБЕНКА 3 ЛЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВОДИТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ В ВИДЕ

- 1)+ общего анализа крови
- 2) электрокардиографии
- 3) нейросонографии
- 4) эхокардиографии

83. СТАТИСТИЧЕСКАЯ ФОРМА СВЕДЕНИЯ О ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРАХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ЕЖЕГОДНО ДО _____ ГОДА, СЛЕДУЮЩЕГО ЗА ОТЧЕТНЫМ

- 1)+ 20 января
- 2) 15 февраля
- 3) 20 февраля
- 4) 30 января

84. ТРЕТЬЯ ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ ДИФТЕРИИ, КОКЛЮША, СТОЛБНЯКА ПРОВОДИТСЯ В ВОЗРАСТЕ ____ МЕСЯЦЕВ

- 1)+ 6
- 2) 3
- 3) 12
- 4) 18

85. ИНКУБАЦИОННЫЙ ПЕРИОД ПРИ ГЕПАТИТЕ «А» ДЛИТСЯ ____ (ДЕНЬ)

- 1)+ 35-36
- 2) 7-21
- 3) 5-7
- 4) 5-14

86. ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ ГРИППА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ДЕТЯМ С ____ МЕСЯЦЕВ

- 1)+ 6
- 2) 4
- 3) 2
- 4) 12

87. ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО, НЕ ДОСТИГШЕГО ____ ЛЕТ, ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ЕГО РОДИТЕЛЮ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ

- 1)+ 15
- 2) 18
- 3) 17
- 4) 16

88. БОЛЬНЫХ КОКЛЮШЕМ ИЗОЛИРУЮТ НА _____ ДНЕЙ ОТ НАЧАЛА ЗАБОЛЕВАНИЯ

- 1)+ 30
- 2) 15
- 3) 20
- 4) 5

89. УРОВЕНЬ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ ОПРЕДЕЛЯЮТ

- 1)+ утром, натощак
- 2) через 1 час после еды
- 3) через 2 часа после еды
- 4) сразу после еды

90. НОРМОЙ ДЛЯ РЕБЕНКА ОДНОГО ГОДА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ закрытый большой родничок
- 2) рост 65 см
- 3) масса тела 8,0 кг
- 4) окружность головы 40 см

91. В РАМКАХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА ВСЕМ ЗДОРОВЫМ ДЕТЯМ В ВОЗРАСТЕ ____ (МЕСЯЦ) ПРОВОДИТСЯ ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЯ

- 1)+ 12
- 2) 2
- 3) 3
- 4) 6

92. ИНКУБАЦИОННЫЙ ПЕРИОД ПРИ ЭПИДЕМИЧЕСКОМ ПАРОТИТЕ ДЛИТСЯ ____ (ДЕНЬ)

- 1)+ 11-21
- 2) 35-36
- 3) 2-3
- 4) 5-7

93. РЕЗУЛЬТАТЫ ФЛЮОРОГРАФИИ ЛЕГКИХ, ВНЕСЕННЫЕ В МЕДИЦИНСКУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО, УЧИТЫВАЮТСЯ, ЕСЛИ ИХ ДАВНОСТЬ НЕ ПРЕВЫШАЕТ _____ (МЕСЯЦ) С ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

- 1)+ 12
- 2) 18
- 3) 24
- 4) 36

94. У ДЕТЕЙ, БОЛЬНЫХ МУКОВИСЦИДОЗОМ, В ПОТЕ СОДЕРЖИТСЯ БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ИОНОВ

- 1)+ натрия
- 2) калия
- 3) кальция
- 4) железа

95. ПРОДУКТОМ С НИЗКИМ СОДЕРЖАНИЕМ ФЕНИЛАЛАНИНА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ капуста
- 2) говядина
- 3) шоколад
- 4) сыр

96. ОБЩАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ I ЭТАПА ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ОСМОТРА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДОЛЖНА СОСТАВЛЯТЬ НЕ БОЛЕЕ _____ РАБОЧИХ ДНЕЙ

- 1)+ 20
- 2) 10
- 3) 14
- 4) 24

97. КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЕТСКОГО ПСИХИАТРА В РАМКАХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА ЗДОРОВОГО РЕБЕНКА ПРОВОДИТСЯ В ВОЗРАСТЕ ____ (МЕСЯЦ)

- 1)+ 24
- 2) 36
- 3) 18
- 4) 12

98. ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА В ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ ПРОВОДИТСЯ ПО СХЕМЕ

- 1)+ 0-1-6
- 2) 0-3-12
- 3) 0-6-12
- 4) 0-1-12

99. УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ПРИОСТАНАВЛИВАЕТСЯ, ЕСЛИ ЧИСЛО ЗАБОЛЕВШИХ ГРИППОМ И ОРВИ ПРЕВЫШАЕТ ____ ПРОЦЕНТОВ

- 1)+ 20
- 2) 5
- 3) 10
- 4) 30

100. ЗА ЛИЦАМИ, ОБЩАВШИМИСЯ С БОЛЬНЫМИ ЭПИДЕМИЧЕСКИМ ПАРОТИТОМ УСТАНОВЛИВАЕТСЯ МЕДИЦИНСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ В ТЕЧЕНИЕ ____ (ДЕНЬ) С МОМЕНТА ВЫЯВЛЕНИЯ ПОСЛЕДНЕГО СЛУЧАЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ В ОЧАГЕ

- 1)+ 21
- 2) 7
- 3) 14
- 4) 36

101. ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТЬЕВОГО РЕЖИМА ДЛЯ ДЕТЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КИПЯЧЕНОЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, ПОСЛЕДНЯЯ ДОЛЖНА КИПЯТИТЬСЯ НЕ МЕНЕЕ ____ МИНУТ

- 1)+ 5
- 2) 8
- 3) 2
- 4) 10

102. ОСНОВНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ СЫПИ ПРИ КРАПИВНИЦЕ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ волдырь
- 2) пузырек
- 3) папула
- 4) бугорок

103. СТЕПЕНЬ НАРУШЕНИЯ СОЗНАНИЯ ОЦЕНИВАЕТСЯ ПО ШКАЛЕ

- 1)+ Глазго
- 2) Ross
- 3) Аппар
- 4) Роттердам

104. ШУМ И БОЛЬ В УШАХ У РЕБЕНКА С ОСТРОЙ РЕСПИРАТОРНОЙ ВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЗНАКОМ

- 1)+ евстахеита
- 2) фарингита
- 3) назофарингита
- 4) синусита

105. РЕБЕНКУ В ВОЗРАСТЕ ОДНОГО ГОДА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ АСКАРИДОЗА НАЗНАЧАЮТ

- 1)+ пирантел
- 2) альбендазол
- 3) мебендазол
- 4) левамизол

106. К СОЦИАЛЬНЫМ ЭФФЕКТАМ ГИГИЕНИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ОТНОСИТСЯ

- 1)+ повышение качества жизни населения
- 2) улучшение медицинского обслуживания
- 3) сокращение убытков от временной нетрудоспособности
- 4) консолидация общества

107. В ТЕЧЕНИЕ 6 ДНЕЙ С МОМЕНТА ПОСТАНОВКИ ПРОБЫ МАНТУ НАПРАВЛЯЮТСЯ НА КОНСУЛЬТАЦИЮ В ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР ДЕТИ В СЛЕДУЮЩЕМ СЛУЧАЕ

- 1)+ с инфильтратом более 17 мм
- 2) с инфильтратом 4-6 мм
- 3) с отрицательной реакцией
- 4) с инфильтратом 8-10 мм

108. НАЗНАЧЕНИЕ ДЖОЗАМИЦИНА ДЕТЯМ ПОКАЗАНО, ЕСЛИ ОСТРЫЙ БРОНХИТ ВЫЗВАН

- 1)+ хламидиями
- 2) риновирусом
- 3) вирусом парагриппа
- 4) аденовирусом

109. В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ВЛАЖНАЯ УБОРКА РЕКРЕАЦИЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ

- 1)+ после каждой перемены
- 2) два раза в день
- 3) по окончании занятий
- 4) утром, перед занятиями

110. ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ В СТАЦИОНАРНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ СЧИТАЕТСЯ НЕ ДОСТИГНУТЫМ ПРИ СУММАРНОЙ ОЦЕНКЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МЕНЕЕ ____ БАЛЛОВ

- 1)+ 6
- 2) 12
- 3) 8
- 4) 10

111. ОСНОВНЫМ ПУТЕМ ПЕРЕДАЧИ ВОЗБУДИТЕЛЯ ТУБЕРКУЛЕЗА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ воздушно-капельный
- 2) алиментарный
- 3) контактный
- 4) трансмиссивный

112. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ПРИКРЕПЛЕННЫХ ДЕТЕЙ НА ПЕДИАТРИЧЕСКОМ УЧАСТКЕ СОСТАВЛЯЕТ _____ ЧЕЛОВЕК

- 1)+ 800
- 2) 700
- 3) 900
- 4) 1200

113. ПРИ ЛЕЧЕНИИ КОРИ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРИЕМ ВИТАМИНА

- 1)+ А
- 2) С
- 3) В
- 4) Д

114. К ЛЕКАРСТВЕННЫМ ПРЕПАРАТАМ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ ГРУППЫ ИНГИБИТОРОВ АПФ ОТНОСИТСЯ

- 1)+ рамиприл
- 2) валсартан
- 3) пропранолол
- 4) амлодипин

115. ОХВАТ ПРИВИВКАМИ ПРОТИВ ГРИППА В ГРУППАХ РИСКА ДОЛЖЕН БЫТЬ НЕ МЕНЕЕ ____ ПРОЦЕНТОВ

- 1)+ 75
- 2) 25
- 3) 95
- 4) 90

116. В ГРУППУ ПРОДУКТОВ, ЧАЩЕ ВСЕГО ВЫЗЫВАЮЩИХ ПИЩЕВУЮ АЛЛЕРГИЮ У ДЕТЕЙ, ВХОДИТ

- 1)+ коровье молоко
- 2) яблоко
- 3) говядина
- 4) груша

117. ВСЕМ ДЕТЯМ С ПОДОЗРЕНИЕМ НА МЕНИНГОКОККОВУЮ ИНФЕКЦИЮ, НЕЗАВИСИМО ОТ ФОРМЫ ЗАБОЛЕВАНИЯ ПРОВОДИТСЯ

- 1)+ бактериологическое обследование носоглоточной слизи
- 2) клиническое исследование цереброспинальной жидкости
- 3) электронейромиограмма
- 4) ультразвуковое исследование головного мозга

118. ОДНИМ ИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ В СТАЦИОНАРНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ мышечная сила
- 2) индекс пикфлоуметрии
- 3) частота дыхания
- 4) частота сердечных сокращений

119. ПРИ ИНВАЗИИ АСКАРИДАМИ В ОБЩЕМ АНАЛИЗЕ КРОВИ ЗНАЧИТЕЛЬНО ПОВЫШАЕТСЯ УРОВЕНЬ

- 1)+ эозинофилов
- 2) базофилов
- 3) лимфоцитов
- 4) моноцитов

120. УВЕЛИЧЕНИЕ ЗАДНЕ-ШЕЙНЫХ ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЗНАКОМ

- 1)+ краснухи
- 2) кори
- 3) ветряной оспы
- 4) дифтерии

121. МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА КАБИНЕТА ЗДОРОВОГО РЕБЕНКА ПРОВОДИТ ПРИЕМ ДЕТЕЙ ВТОРОГО ГОДА ЖИЗНИ НЕ МЕНЕЕ _____ РАЗ В ГОД

- 1)+ 4
- 2) 5
- 3) 3
- 4) 2

122. ЕЖЕГОДНЫЙ ОХВАТ ПРОБОЙ МАНТУ ДЕТЕЙ ДО 14 ЛЕТ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО ДОЛЖЕН СОСТАВЛЯТЬ НЕ МЕНЕЕ _____ ПРОЦЕНТОВ

- 1)+ 95
- 2) 100
- 3) 98
- 4) 90

123. ПРОБУ МАНТУ СЧИТАЮТ СОМНИТЕЛЬНОЙ ПРИ ДИАМЕТРЕ ПАПУЛЫ _____ ММ

- 1)+ 3
- 2) 1
- 3) 10
- 4) 18

124. К ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫМ ПРЕПАРАТАМ 1 РЯДА ОТНОСИТСЯ

- 1)+ изониазид
- 2) канамицин
- 3) теризидон
- 4) меропенем

125. В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ГДЕ ИМЕЕТСЯ КАРАНТИН ПО ДЕТСКИМ ИНФЕКЦИЯМ, ПРОБА МАНТУ ПРОВОДИТСЯ

- 1)+ по окончании карантина
- 2) в период карантина
- 3) через 6 месяцев по окончании карантина
- 4) через 3 месяца по окончании карантина

126. ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛОСКОСТОПИЯ У ДЕТЕЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ОСМОТРОВ ПРИМЕНЯЮТ

- 1)+ плантограф
- 2) динамометр
- 3) спирометр
- 4) тонометр

127. ПРИ ЧЕСОТКЕ ДЕТЯМ ОТ 3 ДО 7 ЛЕТ НАЗНАЧАЮТ ЭМУЛЬСИЮ БЕНЗИЛБЕНЗОАТА В КОНЦЕНТРАЦИИ _____ ПРОЦЕНТОВ

- 1)+ 10
- 2) 15
- 3) 20
- 4) 5

128. ЗА ЛИЦАМИ, ПЕРЕБОЛЕВШИМИ СКАРЛАТИНОЙ, УСТАНОВЛИВАЕТСЯ ДИСПАНСЕРНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ В ТЕЧЕНИЕ _____ ПОСЛЕ ВЫПИСКИ ИЗ СТАЦИОНАРА

- 1)+ 1 месяца
- 2) 6 месяцев
- 3) 1 года
- 4) 3х лет

129. ИЗОЛЯЦИЯ НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ ИЗ ОЧАГА ТУБЕРКУЛЕЗНОЙ ИНФЕКЦИИ ПРОВОДИТСЯ НА СРОК НЕ МЕНЕЕ ____ МЕСЯЦЕВ

- 1)+ 2
- 2) 1
- 3) 3
- 4) 4

130. РИСК ВРОЖДЕННОЙ ПАТОЛОГИИ ПЛОДА ОЧЕНЬ ВЫСОКИЙ В СЛУЧАЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ БЕРЕМЕННОЙ

- 1)+ краснухой
- 2) эпидемическим паротитом
- 3) ветряной оспой
- 4) корью

131. В СТОЛОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ГОТОВЫЕ БЛЮДА ДОЛЖНЫ БЫТЬ РЕАЛИЗОВАНЫ НЕ ПОЗДНЕЕ _____ ЧАСОВ С МОМЕНТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ.

- 1)+ 2
- 2) 1
- 3) 3
- 4) 5

132. ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У ГРАЖДАН, НАЧИНАЯ С ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА, ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ЧЕРЕЗ

- 1)+ информирование о факторах риска для здоровья
- 2) проведение диспансерного наблюдения
- 3) выполнение диагностических процедур
- 4) проведение профилактических осмотров

133. ЛЕКАРСТВЕННЫМ ПРЕПАРАТОМ ДЛЯ ЭТИОТРОПНОГО ЛЕЧЕНИЯ ТЯЖЕЛОЙ ФОРМЫ ГРИППА У ДЕТЕЙ СТАРШЕ 1 ГОДА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ осельтамивир
- 2) кагоцел
- 3) арбидол
- 4) гриппферон

134. ПЕРВИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У ДЕТЕЙ ВКЛЮЧАЕТ

- 1)+ рациональное питание
- 2) кардиопротективную терапию
- 3) исключение физической нагрузки
- 4) обучение на дому

135. ПРОБУ МАНТУ ПРОВОДЯТ НЕ РАНЕЕ ЧЕМ ЧЕРЕЗ _____ ПОСЛЕ ЛЮБОЙ ВАКЦИНАЦИИ

- 1)+ 1 месяц
- 2) 10 дней
- 3) 20 дней
- 4) 2 месяца

136. НАИБОЛЕЕ ЧАСТОЙ ПРИЧИНОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ДО 1 ГОДА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ стеноз почечных артерий
- 2) эссенциальная артериальная гипертензия
- 3) паренхиматозные заболевания почек
- 4) узелковый периартериит

137. В СЛУЧАЕ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ РЕБЕНКОМ В ВОЗРАСТЕ ДО 15 ЛЕТ ЛИСТОК НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ФОРМИРУЕТСЯ

- 1)+ на весь период лечения ребенка
- 2) на период до 7 дней включительно
- 3) на период до 10 дней включительно
- 4) на период до 15 дней включительно

138. ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОПУЛЯЦИОННОГО ИММУНИТЕТА К КОРИ, КРАСНУХЕ, ЭПИДЕМИЧЕСКОМУ ПАРОТИТУ, ОХВАТ ДЕТЕЙ В ДЕКРЕТИРОВАННЫХ ВОЗРАСТАХ ВАКЦИНАЦИЕЙ И РЕВАКЦИНАЦИЕЙ ДОЛЖЕН СОСТАВЛЯТЬ НЕ МЕНЕЕ _____ ПРОЦЕНТОВ

- 1)+ 95
- 2) 98
- 3) 90
- 4) 92

139. ПРИЧИНОЙ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ У ДЕТЕЙ ДО 1 ГОДА ЧАЩЕ ВСЕГО ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ врожденный порок сердца
- 2) инфекционный эндокардит
- 3) инфекционный миокардит
- 4) перикардит

140. К КРИТЕРИЯМ СТРАТИФИКАЦИИ РИСКА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ ОТНОСЯТ

- 1)+ ожирение
- 2) высокую физическую активность
- 3) частые респираторные заболевания
- 4) заболевания ЖКТ в анамнезе

141. ИНФОРМАЦИЯ О ВЫЯВЛЕННОМ СЛУЧАЕ ИНФЕКЦИОННОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ НАПРАВЛЯЕТСЯ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН, УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР ПО МЕСТУ РЕГИСТРАЦИИ ЗАБОЛЕВАНИЯ В ТЕЧЕНИЕ _____ (ЧАС) С МОМЕНТА УСТАНОВЛЕНИЯ ДИАГНОЗА (ПО ТЕЛЕФОНУ)

- 1)+ 2
- 2) 1
- 3) 3
- 4) 4

142. ПОЭТАПНОЕ ВЫСЫПАНИЕ ПЯТНИСТО-ПАПУЛЕЗНОЙ СЛИВНОЙ СЫПИ С 4 - 5 ДНЯ БОЛЕЗНИ ХАРАКТЕРНО ДЛЯ ИНФЕКЦИОННОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ

- 1)+ корь
- 2) ветряная оспа
- 3) эпидемический паротит
- 4) краснуха

143. ПРОБА МАНТУ ПРОВОДИТСЯ 2 РАЗА В ГОД ДЕТЯМ

- 1)+ получающим кортикостероидную терапию
- 2) часто болеющим
- 3) посещающим образовательные организации
- 4) привитым, но из социально неблагополучных семей

144. КОМПЛЕКС МЕДИЦИНСКИХ И НЕМЕДИЦИНСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ РАЗВИТИЯ ОТКЛОНЕНИЙ В СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ, ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ ПОНЯТИЕ

- 1)+ первичная профилактика
- 2) вторичная профилактика
- 3) третичная профилактика
- 4) реабилитация

145. РЕЗУЛЬТАТ ПРОБЫ МАНТУ ОЦЕНИВАЮТ ЧЕРЕЗ ____ (ЧАС)

- 1)+ 72
- 2) 48
- 3) 144
- 4) 36

146. ФЛЮОРОГРАФИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ В ЦЕЛЯХ РАННЕГО ВЫЯВЛЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА ПРОВОДИТСЯ ДЕТЯМ _____ ЛЕТ

- 1)+ 15 и 17
- 2) 12 и 14
- 3) 16 и 17
- 4) 13 и 17

147. В ПЕРЕЧЕНЬ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ, КОТОРАЯ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ, ВХОДИТ

- 1)+ майонез
- 2) печенье
- 3) сливочное масло
- 4) хлеб

148. РЕБЕНКУ В ВОЗРАСТЕ 1,5 ЛЕТ МОЖНО ПРИМЕНЯТЬ АНТИГИСТАМИННЫЙ ПРЕПАРАТ

- 1)+ дезлоратадин
- 2) лоратадин
- 3) левоцетиризин
- 4) фексофенадин

149. РЕЗУЛЬТАТЫ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ДЕТЕЙ-СИРОТ ЗАНОСЯТСЯ В ФОРМУ

- 1)+ 030-Д/с/у-13
- 2) 030-ПО/у-17
- 3) 030-ПО/о-17
- 4) 030-Д/с/о-13

150. ПЛАНОВЫЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ ЮНОШЕЙ ВКЛЮЧАЮТ В СЕБЯ ____ (ЭТАП)

- 1)+ 3
- 2) 4
- 3) 2
- 4) 1

151. В ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРНОГО И ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА ЮНОШЕЙ 12 ЛЕТ НЕ ВХОДИТ

- 1)+ флюорография
- 2) общий анализ крови
- 3) электрокардиография
- 4) анализ кала

152. У ЗДОРОВОГО ДОНОШЕННОГО НОВОРОЖДЕННОГО РЕБЕНКА ЧАСТОТА СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ СОСТАВЛЯЕТ _____ УДАРОВ В МИНУТУ

- 1)+ 120-140
- 2) 170 -190
- 3) 100-120
- 4) 80-100

153. В АНАЛИЗЕ МОЧИ ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ

- 1)+ ацетон
- 2) белок
- 3) билирубин
- 4) уробилин

154. ДЛЯ ВАКЦИНАЦИИ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ОТ 12 ДО 17 ЛЕТ ПРОТИВ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19 ПРИМЕНЯЕТСЯ ВАКЦИНА

- 1)+ «Гам-КОВИД-Вак-М»
- 2) «Спутник Лайт»
- 3) «КовиВак»
- 4) «ЭпиВакКорона»

155. ПЕРВЫЙ ЭТАП ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА ЮНОШЕЙ ВКЛЮЧАЕТ

- 1)+ скрининг-тесты
- 2) осмотр педиатра
- 3) лабораторное обследование
- 4) инструментальное обследование

156. КОНЦЕНТРАЦИОННАЯ ФУНКЦИЯ ПОЧЕК ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ МЕТОДОМ

- 1)+ Зимницкого
- 2) Нечипоренко
- 3) Амбюрже
- 4) Аддиса-Каковского

157. ГЕМАТУРИЯ, ГИПЕРТОНИЧЕСКИЙ И ОТЕЧНЫЙ СИНДРОМЫ У ДЕТЕЙ ЯВЛЯЮТСЯ СИМПТОМАМИ

- 1)+ гломерулонефрита
- 2) цистита
- 3) пиелонефрита
- 4) нефроптоза

158. ПРИ НЕОСЛОЖНЕННОЙ ЯЗВЕ ЖЕЛУДКА ДЛИТЕЛЬНОСТЬ АНТИСЕКРЕТОРНОЙ ТЕРАПИИ ДОЛЖНА СОСТАВЛЯТЬ НЕ МЕНЕЕ _____ НЕДЕЛЬ

- 1)+ 8
- 2) 2
- 3) 5
- 4) 4

159. ОСНОВНЫМ ПРИЗНАКОМ РАЗВИВАЮЩЕГОСЯ СТЕНОЗА ПРИВРАТНИКА У ДЕТЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ рвота накануне съеденной пищей
- 2) ноющие боли в эпигастрии
- 3) нарушение стула
- 4) изжога

160. ЗАБОЛЕВАНИЕМ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИМ РАЗВИТИЕМ ВОСПАЛЕНИЯ В РАСШИРЕННЫХ БРОНХАХ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ бронхоэктатическая болезнь
- 2) абсцесс легкого
- 3) острая пневмония
- 4) экссудативный плеврит

161. ОСНОВНЫМИ КЛИНИЧЕСКИМИ СИМПТОМАМИ ПРИ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ У РЕБЕНКА ЯВЛЯЮТСЯ

- 1)+ бледность, ломкость ногтей, тусклые волосы, плохой аппетит, извращение вкуса
- 2) гиперемия лица, ускоренный рост волос
- 3) бледность, ломкость ногтей и волос, увеличение селезенки, геморрагическая сыпь
- 4) бледность, носовые кровотечения, поражение суставов

162. ПРИ ЖЕЛУДОЧНОМ КРОВОТЕЧЕНИИ НЕОБХОДИМО

- 1)+ положить пузырь со льдом на живот
- 2) положить грелку на живот
- 3) промыть желудок
- 4) поставить масляную клизму

163. ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ДИАГНОЗА ОСТРЫЙ ЛЕЙКОЗ ПРОВОДИТСЯ

- 1)+ стерильная пункция
- 2) УЗИ печени
- 3) биохимический анализ крови
- 4) УЗИ селезенки

164. ПРИ ВЕТРЯНОЙ ОСПЕ ВЕЗИКУЛЫ НА КОЖЕ ОБРАБАТЫВАЮТ

- 1)+ 2% спиртовым раствором бриллиантового зеленого
- 2) 2% водным раствором бриллиантового зеленого
- 3) 5% спиртовым раствором йода
- 4) камфорным спиртом

165. ПРИ НАБОРЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ИГЛА ВО ФЛАКОН ВВОДИТСЯ ПОД УГЛОМ ____ ГРАДУСОВ

- 1)+ 90
- 2) 45
- 3) 30
- 4) 60

166. ВСЕМ ДЕТЯМ С ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПРОВОДИТСЯ

- 1)+ общий анализ крови
- 2) исследование кала на скрытую кровь
- 3) исследование уровня гастрина в сыворотке крови
- 4) определение pH в желудочном содержимом

167. ПАЦИЕНТУ С ХРОНИЧЕСКОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ СЛЕДУЕТ ОГРАНИЧИВАТЬ УПОТРЕБЛЕНИЕ ПРОДУКТОВ БОГАТЫХ

- 1)+ белками
- 2) калием
- 3) углеводами
- 4) клетчаткой

168. РАННИМИ СИМПТОМАМИ ТУБЕРКУЛЕЗА ЯВЛЯЮТСЯ

- 1)+ длительный субфебрилитет, покашливание
- 2) одышка, "ржавая" мокрота
- 3) приступ удушья, стекловидная мокрота
- 4) лихорадка, кашель с гнойной мокротой

169. ПРИ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ У РЕБЕНКА ЦВЕТ КОЖНЫХ ПОКРОВОВ

- 1)+ бледный
- 2) желтушный
- 3) цианотичный
- 4) гиперемированный

170. ХАРАКТЕРНЫМ СИМПТОМОМ РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ утренняя скованность мелких суставов
- 2) боли в крупных суставах вечером
- 3) симптом "перебегающей хромоты"
- 4) боль и нарушение подвижности в позвоночнике

171. УСТРОЙСТВОМ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫМ ДЛЯ ВВЕДЕНИЯ В ОРГАНИЗМ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ АЭРОЗОЛЬНЫМ СПОСОБОМ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ небулайзер
- 2) мешок Амбу
- 3) кислородная лицевая маска
- 4) носовая канюля

172. ОБОСТРЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОГО ХОЛЕЦИСТИТА У ДЕТЕЙ ПРОВОЦИРУЕТ ПРИЕМ

- 1)+ жирной пищи
- 2) жидкости
- 3) углеводов
- 4) витаминов

173. ПРИЧИНОЙ ПЕЧЕНОЧНОЙ КОЛИКИ У ДЕТЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ желчекаменная болезнь
- 2) гастрит
- 3) панкреатит
- 4) язвенная болезнь желудка

174. ПРИ ГИПОТИРЕОЗЕ ДЕТЯМ НАЗНАЧАЮТ

- 1)+ левотироксин натрия
- 2) преднизолон
- 3) тиамазол
- 4) дексаметазон

175. ПРИ ПОДГОТОВКЕ ПАЦИЕНТА К РЕКТОМАНОСКОПИИ ИЛИ КОЛОНОСКОПИИ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ДОЛЖНА ВЫПОЛНИТЬ

- 1)+ очистительную клизму накануне и за 2 часа до исследования
- 2) сифонную клизму вечером
- 3) масляную клизму утром
- 4) сифонную клизму накануне и за 2 часа до исследования

176. ПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ ВВЕДЕНИЯ ГАЗООТВОДНОЙ ТРУБКИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ метеоризм
- 2) запор
- 3) непроходимость кишечника
- 4) операция

177. ПРИ УХОДЕ ЗА НАЗОГАСТРАЛЬНЫМ ЗОНДОМ, ЕГО ПРОМЫВАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ КАЖДЫЕ ____ ЧАСА (ПО НАЗНАЧЕНИЮ ВРАЧА)

- 1)+ 3
- 2) 4
- 3) 5
- 4) 6

178. ДЛЯ ПОСТАНОВКИ _____ КЛИЗМЫ ПРИМЕНЯЕТСЯ КРУЖКА ЭСМАРХА

- 1)+ очистительной
- 2) сифонной
- 3) гипертонической
- 4) масляной

179. ПРИ АНЕМИЯХ В ОБЩЕМ КЛИНИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ КРОВИ НАБЛЮДАЕТСЯ СНИЖЕНИЕ

- 1)+ эритроцитов, гемоглобина
- 2) лейкоцитов, нейтрофилов
- 3) тромбоцитов
- 4) эозинофилов

180. ПРИ ГИПОТРОФИИ II СТЕПЕНИ ДЕФИЦИТ МАССЫ СОСТАВЛЯЕТ ____ ПРОЦЕНТОВ

- 1)+ 21-30
- 2) 10-15
- 3) более 30
- 4) 5-10

181. ОСНОВНЫМ КЛИНИЧЕСКИМ ПРОЯВЛЕНИЕМ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ приступ удушья с затрудненным выдохом
- 2) кашель с выделением пенистой мокроты
- 3) одышка смешанного характера
- 4) инспираторная одышка

182. ОСЛОЖНЕНИЕМ ПРИ ИНГАЛЯЦИОННОМ ПРИМЕНЕНИИ ГЛЮКОКОРТИКОИДОВ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ кандидоз полости рта
- 2) артериальная гипертензия
- 3) мышечная слабость
- 4) язва желудка

183. ПРИ ПИЕЛОНЕФРИТЕ В МОЧЕ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО

- 1)+ лейкоцитов
- 2) эритроцитов
- 3) глюкозы
- 4) билирубина

184. ОСНОВНЫМ ПРЕПАРАТОМ В ЛЕЧЕНИИ ДИФТЕРИИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ сыворотка
- 2) глобулин
- 3) глюкокортикоиды
- 4) вакцина

185. ЭЗОФАГОГASTРОДУОДЕНоскоп ПРИМЕНЯЕТСЯ для осмотРАслизистой оболочКи

- 1)+ пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки
- 2) ободочной, сигмовидной и прямой кишки
- 3) прямой кишки
- 4) мочевого пузыря

186. В СТРУКТУРЕ ОСЛОЖНЕНИЙ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ у ДЕТЕЙ ПРЕОБЛАДАЕТ

- 1)+ кровотечение
- 2) стеноз
- 3) пенетрация
- 4) перфорация

187. ПРИ ОБСТРУКТИВНОМ БРОНХИТЕ ОСНОВНОЙ ЖАЛОБОЙ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ одышка
- 2) повышение температуры
- 3) сонливость
- 4) головная боль

188. ОДНИМ ИЗ КРИТЕРИЕВ КАЧЕСТВА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ ПРИ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ определение инфицированности н. pylori
- 2) проведении УЗИ желудочно-кишечного тракта
- 3) проведении рентгенологического исследования желудка
- 4) проведении желудочного зондирования

189. для ВнутРимышечного ВВЕДЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ОДНОРАЗОВЫЙ шПРИЦ емКОСТЬЮ __ мл

- 1)+ 5
- 2) 1
- 3) 20
- 4) 2

190. МЕСТОМ ЛОКАЛИЗАЦИИ ПЯТЕН БЕЛЬСКОГО-ФИЛАТОВА-КОПЛИКА ПРИ КОРИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ слизистая щеки
- 2) живот
- 3) спина
- 4) лицо

191. ИСТОЧНИКОМ ИНФЕКЦИИ ПРИ АНТРОПОНОЗНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ человек
- 2) животное
- 3) насекомое
- 4) птица

192. ОСНОВНЫМИ СИМПТОМАМИ САХАРНОГО ДИАБЕТА У ДЕТЕЙ ЯВЛЯЮТСЯ

- 1)+ полидипсия, полиурия
- 2) отеки, боль в пояснице
- 3) сухой кашель, одышка
- 4) запоры, боли в животе

193. ДЛЯ ВНУТРИКОЖНОГО ВВЕДЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ОДНОРАЗОВЫЙ ШПРИЦ ЕМКОСТЬЮ __ МЛ

- 1)+ 1
- 2) 5
- 3) 10
- 4) 20

194. ПРИ ОБОСТРЕНИИ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ ИЗ ПИТАНИЯ ИСКЛЮЧАЮТ

- 1)+ мясные бульоны
- 2) молочные каши
- 3) крупяные супы
- 4) молочные продукты

195. ПРИ НАЛИЧИИ У РЕБЕНКА С СЕРДЕЧНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ ОТЕКОВ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ПОРЕКОМЕНДУЕТ

- 1)+ ограничить прием жидкости и соли
- 2) увеличить прием жидкости и соли
- 3) увеличить прием белков и жиров
- 4) ограничить прием белков и жиров

196. ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ БРОНХОЭКТАТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПРОВОДЯТ

- 1)+ бронхографию
- 2) флюорографию
- 3) рентгенографию органов грудной клетки
- 4) спирометрию

197. «РЖАВЫЙ» ХАРАКТЕР МОКРОТЫ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЗНАКОМ

- 1)+ острой пневмонии
- 2) бронхиальной астмы
- 3) острого плеврита
- 4) острого бронхита

198. АДЕКВАТНЫМ МЕТОДОМ КОНТРОЛЯ ЗА ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ И БЕЗОПАСНОСТЬЮ ГИПОТЕНЗИВНОЙ ТЕРАПИИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ суточное мониторирование АД
- 2) регистрация ЭКГ
- 3) измерение АД утром и вечером
- 4) подсчет пульса утром и вечером

199. ПРИ ФЕНИЛКЕТОНУРИИ ОТ РЕБЕНКА ОЩУЩАЕТСЯ ЗАПАХ

- 1)+ мышиный
- 2) аммиака
- 3) чесночный
- 4) ацетона

200. ПРИ ФЕНИЛКЕТОНУРИИ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ РАЗВИВАЕТСЯ ПОРАЖЕНИЕ

- 1)+ головного мозга
- 2) мышечной ткани
- 3) почек
- 4) миокарда

201. СУБЛИНГВАЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕДПОЛАГАЕТ ВВЕДЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ

- 1)+ под язык
- 2) в прямую кишку
- 3) в дыхательные пути
- 4) на кожу

202. ЛЮМБАЛЬНУЮ ПУНКЦИЮ ПРОВОДЯТ В ПОЛОЖЕНИИ БОЛЬНОГО

- 1)+ лежа на боку
- 2) лежа на животе
- 3) сидя
- 4) стоя

203. МЕШОК АМБУ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

- 1)+ при искусственной вентиляции лёгких
- 2) при оксигенотерапии
- 3) для предупреждения западения языка
- 4) для обеспечения проходимости дыхательных путей

204. ПРИ ГЕМОФИЛИИ ВСЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ РЕБЕНКУ ВВОДЯТСЯ ТОЛЬКО

- 1)+ внутривенно
- 2) внутримышечно
- 3) подкожно
- 4) внутрикожно

205. ПРЕОБЛАДАНИЕ НОЧНОГО ДИУРЕЗА НАЗЫВАЕТСЯ

- 1)+ никтурия
- 2) ишурия
- 3) поллакиурия
- 4) полиурия

206. СПЕЦИФИЧЕСКИМ АНТАГОНИСТОМ ОПИОИДНЫХ АНАЛЬГЕТИКОВ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ налоксон
- 2) унитиол
- 3) атропин
- 4) апоморфина гидрохлорид

207. МЕСТОМ ЛОКАЛИЗАЦИИ БОЛЕЙ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ГАСТРИТЕ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ эпигастральная область
- 2) правое подреберье
- 3) околопупочная область
- 4) левое подреберье

208. К СЕРДЕЧНЫМ ГЛИКОЗИДАМ ОТНОСИТСЯ ПРЕПАРАТ

- 1)+ коргликон
- 2) ибупрофен
- 3) атенолол
- 4) каптоприл

209. ДЛЯ КУПИРОВАНИЯ КРУПА ЭФФЕКТИВНО ИНГАЛЯЦИОННОЕ ВВЕДЕНИЕ

- 1)+ будесонида
- 2) эуфилина
- 3) сальбутамола
- 4) фенотерола

210. ПРИ ГИПОТИРЕОЗЕ У РЕБЕНКА В КРОВИ ПОВЫШЕН УРОВЕНЬ _____ ГОРМОНА

- 1)+ тиреотропного
- 2) адренокортикотропного
- 3) соматотропного
- 4) фолликулстимулирующего

211. ОДНИМ ИЗ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ ОСТРОГО ОБСТРУКТИВНОГО ЛАРИНГИТА (КРУПА) ПО ШКАЛЕ WESTLEY ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ втяжение уступчивых мест грудной клетки
- 2) артериальное давление
- 3) частота сердечных сокращений
- 4) частота дыхательных движений

212. В СЛУЧАЕ ТЯЖЕЛОГО ТЕЧЕНИЯ ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА «В» И НЕЭФФЕКТИВНОСТИ КОНСЕРВАТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ РЕКОМЕНДУЕТСЯ

- 1)+ плазмаферез
- 2) глюкокортикоиды
- 3) переливание плазмы
- 4) переливание эритроцитарной массы

213. К ПРИОБРЕТЕННОМУ ПОРОКУ СЕРДЦА ОТНОСИТСЯ

- 1)+ митральный стеноз
- 2) тетрада Фалло
- 3) дефект межпредсердной перегородки
- 4) дефект межжелудочковой перегородки

214. ПРЕПАРАТОМ ДЛЯ ЭТИОТРОПНОЙ ТЕРАПИИ БОЛЬНЫХ СПРИЗНАКАМИ НЕБЛАГОПРИЯТНОГО ТЕЧЕНИЯ ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА «В» ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ ламивудин
- 2) декстроза
- 3) преднизолон
- 4) метоклопрамид

215. НАИБОЛЕЕ ДОСТУПНЫМ И ИНФОРМАТИВНЫМ МЕТОДОМ ДИАГНОСТИКИ ИНФИЦИРОВАННОСТИ H. PYLORI У ДЕТЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ ПРОВЕДЕНИЕ

- 1)+ 13С-уреазного дыхательного теста
- 2) иммуноферментного анализа
- 3) гистологического анализа
- 4) бактериологического анализа

216. КОНКРЕМЕНТОМ ИНФЕКЦИОННОГО ГЕНЕЗА ПРИ РАЗВИТИИ МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ У ДЕТЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ фосфаты магния
- 2) оксалаты кальция
- 3) фосфаты кальция
- 4) мочевая кислота

217. К ЯДАМ ГЕМИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ ОТНОСИТСЯ

- 1)+ угарный газ
- 2) алкоголь
- 3) резерпин
- 4) атропин

218. ПРИ ОБМОРОКЕ РЕБЕНКУ ПРИДАЮТ ПОЛОЖЕНИЕ ТЕЛА

- 1)+ с приподнятым ножным концом
- 2) с приподнятым головным концом
- 3) горизонтально
- 4) полусидя

219. ВЫЯВЛЕНИЕ ПОВЫШЕННОГО УРОВНЯ АМИНОТРАНСФЕРАЗ В СЫВОРОТКЕ ПРИ ГЕПАТИТЕ В ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЗНАКОМ

- 1)+ цитолиза гепатоцитов
- 2) нарушения обмена билирубина
- 3) холестаза
- 4) внутрипеченочного билистаза

220. ДЛЯ ОЦЕНКИ БОЛИ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕ 3 ЛЕТ, А ТАКЖЕ У ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙ РЕЧЕВОГО И УМСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

- 1)+ метод наблюдения
- 2) рейтинговая шкала Вонга-Бейкера
- 3) цветная шкала Эланда
- 4) визуально-аналоговая шкала

221. СЕРЬЕЗНЫМ ОСЛОЖНЕНИЕМ ВНУТРИМЫШЕЧНОЙ ИНЪЕКЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ абсцесс
- 2) эмболия
- 3) тромбоз
- 4) гиперемия

222. ОТ РЕБЕНКА С ГИПЕРГЛИКЕМИЧЕСКОЙ КОМОЙ ЧУВСТВУЕТСЯ ЗАПАХ

- 1)+ ацетона
- 2) аммиака
- 3) «мышинный»
- 4) сладковатый

223. ДЛЯ ОЦЕНКИ СТЕПЕНИ САТУРАЦИИ КРОВИ КИСЛОРОДОМ ПРИ ОСТРОМ ОБСТРУКТИВНОМ ЛАРИНГИТЕ ПРИМЕНЯЮТ

- 1)+ пульсоксиметрию
- 2) пикфлоуметрию
- 3) спирометрию
- 4) спирографию

224. УРОВЕНЬ ОБЩЕГО БИЛИРУБИНА ПРИ ГЕПАТИТЕ В СРЕДНЕЙ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ СОСТАВЛЯЕТ ___ МКМОЛЬ/ Л

- 1)+ 100-170
- 2) 170-200
- 3) 200-250
- 4) 80-100

225. ИНСПИРАТОРНАЯ ОДЫШКА ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЗНАКОМ

- 1)+ острого обструктивного ларингита (круп)
- 2) бронхиальной астмы
- 3) острой пневмонии
- 4) острого бронхита

226. ПАЛЫЦЫ В ВИДЕ «БАРАБАННЫХ ПАЛОЧЕК» У РЕБЕНКА МОГУТ БЫТЬ ПРИЗНАКОМ

- 1)+ бронхоэктатической болезни
- 2) острой пневмонии
- 3) сухого плеврита
- 4) острого бронхита

227. К ЯДАМ ГЕПАТОТРОПНОГО ДЕЙСТВИЯ ОТНОСИТСЯ

- 1)+ соль свинца
- 2) коргликон
- 3) анилин
- 4) уксусная кислота

228. К ГЕНЕТИЧЕСКИМ ПРИЧИНАМ ВЫСОКОГО РИСКА РАЗВИТИЯ МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ У ДЕТЕЙ ОТНОСИТСЯ

- 1)+ цистинурия
- 2) стриктура мочеточника
- 3) дивертикул чашечки
- 4) уретероцеле

229. ПРИ АУТОИММУННОМ ГЕПАТИТЕ У ДЕТЕЙ В КРОВИ ПОВЫШАЕТСЯ УРОВЕНЬ

- 1)+ прямого билирубина
- 2) непрямого билирубина
- 3) общего белка
- 4) протромбина

230. К ТИАЗИДНЫМ ДИУРЕТИКАМ ОТНОСИТСЯ

- 1)+ индапамид
- 2) буметанид
- 3) фуросемид
- 4) амилорид

231. В МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЛЮБОЙ ИНЪЕКЦИИ ОБЯЗАТЕЛЬНО ВХОДИТ

- 1)+ кожный антисептик
- 2) жгут венозный
- 3) подушечка из влагостойкого материала
- 4) стойка-штатив

232. ЭКСПИРАТОРНАЯ ОДЫШКА ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЗНАКОМ

- 1)+ бронхиальной астмы
- 2) отека легких
- 3) инородного тела трахеи
- 4) острой пневмонии

233. ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ПРОБОДЕНИИ ЯЗВЫ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА

- 1)+ обеспечивает полный покой пациенту
- 2) кладет грелку на живот
- 3) вводит метамизол натрия
- 4) промывает желудок

234. ВТОРЫМ ЭТАПОМ РАЗРАБОТКИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ РЕАБИЛИТАЦИИ ИЛИ АБИЛИТАЦИИ РЕБЕНКА-ИНВАЛИДА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ оценка реабилитационного и абилитационного потенциала
- 2) проведение реабилитационно-абилитационной экспертной диагностики
- 3) определение реабилитационных или абилитационных мероприятий
- 4) определение реабилитационного и абилитационного прогноза

235. ПРИ ОСТРОМ ПИЕЛОНЕФРИТЕ В МОЧЕ ОТМЕЧАЕТСЯ БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО

- 1)+ лейкоцитов
- 2) эритроцитов
- 3) белка
- 4) глюкозы

236. ПЕРЕД ВВЕДЕНИЕМ ЛЮБОГО ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ОБЯЗАТЕЛЬНО

- 1)+ проверяет срок годности
- 2) подогревает лекарственное средство
- 3) разводит лекарственное средство физиологическим раствором
- 4) проводит пробу на наличие аллергической реакции

237. ПРИ ЛЕЧЕНИИ АТОПИЧЕСКОГО ДЕРМАТИТА У РЕБЕНКА МОМЕТАЗОН МОЖЕТ НАЗНАЧАТЬСЯ С ____ ЛЕТ(ГОДА)

- 1)+ 2
- 2) 1
- 3) 12
- 4) 15

238. ПРИЕМ АЛЬМАГЕЛЯ ПРИ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ

- 1)+ за полчаса до приема пищи
- 2) во время еды
- 3) сразу после еды
- 4) за два часа до приема пищи

239. ПРИ ПРИЕМЕ ПРЕПАРАТА ДЕ-НОЛ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ДОЛЖНА ПРЕДУПРЕДИТЬ ПАЦИЕНТА О ВОЗМОЖНОСТИ

- 1)+ появления темного стула
- 2) повышения температуры
- 3) развития тахикардии
- 4) появления повышенного потоотделения

240. ПРИ ТЯЖЕЛОМ ТЕЧЕНИИ ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА В ДОЛЖЕН БЫТЬ ОБЕСПЕЧЕН _____ РЕЖИМ

- 1)+ СТРОГИЙ ПОСТЕЛЬНЫЙ
- 2) ПОСТЕЛЬНЫЙ
- 3) ПАЛАТНЫЙ
- 4) АМБУЛАТОРНЫЙ

241. ОСЛОЖНЕНИЕМ ПРИЕМА СЕРДЕЧНЫХ ГЛИКОЗИДОВ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ экстрасистолия
- 2) синусовая тахикардия
- 3) фибрилляция предсердий
- 4) пароксизмальная наджелудочковая тахикардия

242. ПРИ АЛЛЕРГИЧЕСКОЙ ПУРПУРЕ (БОЛЕЗНЬ ШЕНЛЕЙНА-ГЕНОХА) СЫПЬ

- 1)+ мелкопятнистая, геморрагическая симметричная
- 2) в виде хаотичных геморрагий разных размеров
- 3) геморрагическая звездчатая хаотичная
- 4) пятнисто папулезная, с характерной этапностью высыпаний

243. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕДЕНИЯ РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ ИЛИ АБИЛИТАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ

- 1)+ при очередном проведении медико-социальной экспертизы
- 2) при посещении участкового педиатра
- 3) при патронаже социальным работником
- 4) при патронаже медицинской сестрой

244. МЕТОДОМ ИНТРАКОРПОРАЛЬНОЙ ДЕТОКСИКАЦИИ ОРГАНИЗМА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ перитонеальный диализ
- 2) плазмаферез
- 3) гемодиализ
- 4) гемосорбция

245. ПРИ ОТРАВЛЕНИИ МЕТАНОЛОМ В КАЧЕСТВЕ АНТИДОТА ПРИМЕНЯЕТСЯ

- 1)+ этанол
- 2) налоксон
- 3) атропин
- 4) унитиол

246. ПРИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ МОКРОТА

- 1)+ вязкая, стекловидная
- 2) жидкая, слизистая,
- 3) пенистая, розовая
- 4) желто-зеленая, жидкая

247. БИОХИМИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЕМ, ОТРАЖАЮЩИМ ФУНКЦИЮ ПОЧЕК, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ креатинин
- 2) билирубин
- 3) глюкоза
- 4) кальций

248. ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИНЪЕКЦИОННЫХ ИГЛ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ГОТОВИТ

- 1)+ непрокалываемый контейнер
- 2) мешок красного цвета
- 3) бумажный контейнер
- 4) мешок желтого цвета

249. УСИЛЕНИЕ БОЛЕВОГО СИНДРОМА ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ КИШЕЧНИКА ОТМЕЧАЕТСЯ

- 1)+ перед актом дефекации
- 2) после приема пищи
- 3) при изменении положения тела
- 4) при наклоне вперед

250. КЛИНИЧЕСКИЕ СИМПТОМЫ КРУПА- ОСИПЛОСТЬ, ГРУБЫЙ НАВЯЗЧИВЫЙ КАШЕЛЬ, ВЫРАЖЕННАЯ ОДЫШКА, ВОЗБУЖДЕНИЕ, ДЫХАНИЕ С УЧАСТИЕМ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ МУСКУЛАТУРЫ,ЦИАНОЗ НОСОГУБНОГО ТРЕУГОЛЬНИКА СООТВЕТСТВУЮТ _____ СТЕПЕНИ СТЕНОЗА ГОРТАНИ

- 1)+ 2
- 2) 1
- 3) 3
- 4) 4

251. ПОСЛЕ ДЕЗИНФЕКЦИИ МЕСТА ВЕНЕПУНКЦИИ АНТИСЕПТИЧЕСКИМ РАСТВОРОМ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА

- 1)+ ждет полного самостоятельного высыхания
- 2) протирает место венепункции сухим ватным тампоном
- 3) дует на место венепункции для быстрого высыхания
- 4) протирает место венепункции сухим марлевым тампоном

252. ВЕДУЩЕЙ ЖАЛОБОЙ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ГНОЙНОМ СРЕДНЕМ ОТИТЕ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ снижение слуха
- 2) повышение температуры
- 3) головная боль
- 4) головокружение

253. В ЛЕЧЕНИИ АУТОИММУННОГО ГЕПАТИТА У ДЕТЕЙ ПРЕПАРАТОМ ВЫБОРА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ преднизолон
- 2) бетаметазон
- 3) дексаметазон
- 4) клобетазон

254. ЭРИТЕМА НА ЛИЦЕ, НАПОМИНАЮЩАЯ БАБОЧКУ, ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЗНАКОМ

- 1)+ системной красной волчанки
- 2) острой ревматической лихорадки
- 3) системной склеродермии
- 4) узелкового периартериита

255. ПРИ ВВЕДЕНИИ ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА С ПОМОЩЬЮ КЛИЗМЫ РЕБЕНКУ В ВОЗРАСТЕ 5 МЕСЯЦЕВ, ЕГО УКЛАДЫВАЮТ

- 1)+ на спину
- 2) на живот
- 3) на левый бок
- 4) на правый бок

256. ВЕДУЩИМ ПРИЗНАКОМ СТЕНОЗА ГОРТАНИ У ДЕТЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ инспираторная одышка
- 2) гипертермия
- 3) судорожная готовность
- 4) экспираторная одышка

257. ДЕТАМ ДО 3 ЛЕТ ПРИ ПРОМЫВАНИИ ЖЕЛУДКА ИСПОЛЬЗУЮТ

- 1)+ раствор хлорида натрия
- 2) воду
- 3) раствор глюкозы
- 4) раствор перманганата калия

258. В ПЕРИОД ПОВЫШЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ РЕБЕНКУ ТРЕБУЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПИТЬЕ ИЗ РАСЧЕТА ____ МЛ НА 1 КГ МАССЫ ТЕЛА

- 1)+ 10
- 2) 20
- 3) 50
- 4) 40

259. ПРИ ГИПОГЛИКЕМИЧЕСКОЙ КОМЕ КОЖА РЕБЕНКА

- 1)+ бледная, влажная
- 2) розовая, сухая
- 3) желтушная, сухая
- 4) цианотичная, влажная

260. ПОЛИМОРФНАЯ СЫПЬ (ПЯТНО, ПАПУЛА, ВЕЗИКУЛА) НАБЛЮДАЕТСЯ В ПЕРИОДЕ РАЗГАРА ИНФЕКЦИОННОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ

- 1)+ ветряная оспа
- 2) корь
- 3) краснуха
- 4) скарлатина

261. ИНФЕКЦИОННЫМ ЗАБОЛЕВАНИЕМ, ПРИ КОТОРОМ СЫПЬ ВСТРЕЧАЕТСЯ В 10-15 ПРОЦЕНТАХ СЛУЧАЕВ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ инфекционный мононуклеоз
- 2) корь
- 3) ветряная оспа
- 4) скарлатина

262. ВЫПИСКА БОЛЬНОГО ДИФТЕРИЕЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПОСЛЕ ПОЛНОГО КЛИНИЧЕСКОГО ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ И ____-КРАТНОГО БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ НА НАЛИЧИЕ ВОЗБУДИТЕЛЯ ДИФТЕРИИ С ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ РЕЗУЛЬТАТОМ.

- 1)+ 2
- 2) 1
- 3) 3
- 4) 4

263. ОТДЕЛОМ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА, ЧАЩЕ ВСЕГО ПОРАЖАЮЩИМСЯ ПРИ ШИГЕЛЛЕЗЕ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ сигмовидная и прямая кишка
- 2) желудок
- 3) двенадцатиперстная кишка
- 4) ободочная кишка

264. ПРИ ЖИЗНЕУГРОЖАЮЩИХ ПРОЯВЛЕНИЯХ ПИЩЕВОЙ АЛЛЕРГИИ РЕБЕНКУ НАЗНАЧАЮТ

- 1)+ эпинефрин
- 2) цетиризин
- 3) фексофенадин
- 4) дезлоратадин

265. БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭРИТРОЦИТОВ, ВЫЯВЛЕННОЕ В ОБЩЕМ АНАЛИЗЕ МОЧИ, НАЗЫВАЕТСЯ

- 1)+ гематурия
- 2) цилиндрурия
- 3) пиоурия
- 4) лейкоцитурия

266. КУРАРЕПОДОБНЫЙ ЭФФЕКТ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИМИ СОЕДИНЕНИЯМИ ПРОЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ периферическими параличами
- 2) клоническими судорогами
- 3) гиперкинезами
- 4) гиперсаливацией

267. МЕСТОМ ДЛЯ ПОДКОЖНОГО ВВЕДЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ наружная поверхность плеча
- 2) внутренняя поверхность плеча
- 3) внутренняя поверхность бедра
- 4) надлопаточная область

268. МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОХОДЯТ ИНСТРУКТАЖ ПО ВЗЯТИЮ КЛИНИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА НА ДИФТЕРИЮ НЕ РЕЖЕ 1 РАЗА В _____

- 1)+ 6 месяцев
- 2) 3 месяца
- 3) 12 месяцев
- 4) в 2 года

269. РАХИТ РАЗВИВАЕТСЯ ВСЛЕДСТВИЕ НЕДОСТАТКА ВИТАМИНА

- 1)+ D
- 2) A
- 3) B
- 4) C

270. ПАРАЛИЧ ДЫХАТЕЛЬНОЙ МУСКУЛАТУРЫ РАЗВИВАЕТСЯ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ

- 1)+ фосфорорганическими соединениями
- 2) атропином
- 3) этанолом
- 4) метанолом

271. ИНКУБАЦИОННЫЙ ПЕРИОД ПРИ МЕНИНГОКОККОВОЙ ИНФЕКЦИИ СОСТАВЛЯЕТ ____ (ДЕНЬ)

- 1)+ 1-10
- 2) 14-21
- 3) 5-7
- 4) 35-36

272. К ЛОКАЛИЗОВАННОЙ ФОРМЕ МЕНИНГОКОККОВОЙ ИНФЕКЦИИ ОТНОСИТСЯ

- 1)+ назофарингит
- 2) менингококкемия.
- 3) менингит
- 4) менингоэнцефалит

273. ПРИ ВВЕДЕНИИ НЕПОДОГРЕТЫХ МАСЛЯНЫХ РАСТВОРОВ ВОЗМОЖНО ОБРАЗОВАНИЕ

- 1)+ инфильтрата
- 2) тромба
- 3) эмбола
- 4) волдыря

274. МЕСТОМ ЛОКАЛИЗАЦИИ ПЕРВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ СЫПИ ПРИ КОРИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ лицо
- 2) живот
- 3) руки
- 4) ноги

275. ВСЕМ ДЕТЯМ С ВЫСОКИМ РИСКОМ РАЗВИТИЯ ПОВТОРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАМНЕЙ РЕКОМЕНДУЕТСЯ

- 1)+ потребление жидкости в большом количестве
- 2) увеличенное количество белка
- 3) снижение потребления углеводов
- 4) увеличение потребления молочных продуктов

276. К МЕНИНГИАЛЬНЫМ ОТНОСИТСЯ СИМПТОМ

- 1)+ Брудзинского
- 2) Лассега
- 3) Мерфи
- 4) Василенко

277. КАЛ ДЛЯ БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ДОСТАВЛЯЮТ В ЛАБОРАТОРИЮ НЕ ПОЗДНЕЕ ____ (ЧАС) ПОСЛЕ ЗАБОРА МАТЕРИАЛА

- 1)+ 2
- 2) 1
- 3) 3
- 4) 4

278. ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ К ЛЕЧЕНИЮ СРЕДСТВАМИ КИНЕЗОТЕРАПИИ В ПЕДИАТРИИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ кровотечение
- 2) детский церебральный паралич
- 3) болезнь Дауна
- 4) парезы

279. ПЕРВАЯ ПОРЦИЯ ВОДЫ ДЛЯ ПРОМЫВАНИЯ ЖЕЛУДКА ДЕТЯМ СОСТАВЛЯЕТ ____ МЛ НА КГ ВЕСА

- 1)+ 15
- 2) 25
- 3) 5
- 4) 50

280. ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ ДЛЯ ПОСТАНОВКИ ОЧИСТИТЕЛЬНОЙ КЛИЗМЫ ПРИ АТОНИЧЕСКИХ ЗАПОРАХ СОСТАВЛЯЕТ ____ ГРАДУСОВ ЦЕЛЬСИЯ

- 1)+ 16-20
- 2) 23-25
- 3) 20-25
- 4) 37-38

281. ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ В МОЧЕ ВЫЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ глюкоза
- 2) белок
- 3) билирубин
- 4) уробилин

282. ПОЯВЛЕНИЕ ВОДОБОЯЗНИ, ВОЗБУЖДЕНИЯ, ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ ПРИЗНАКОВ

- 1)+ бешенства
- 2) столбняка
- 3) дифтерии
- 4) коклюша

283. ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ ДЛЯ ПОСТАНОВКИ ОЧИСТИТЕЛЬНОЙ КЛИЗМЫ СОСТАВЛЯЕТ ____ ГРАДУСОВ ЦЕЛЬСИЯ

- 1)+ 23-25
- 2) 16-20
- 3) 37-38
- 4) 39-40

284. ПРИ АТОПИЧЕСКОМ ДЕРМАТИТЕ У ДЕТЕЙ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА МОЖЕТ РЕКОМЕНДОВАТЬ УМЕНЬШИТЬ УПОТРЕБЛЕНИЕ

- 1)+ углеводов
- 2) поваренной соли
- 3) жиров
- 4) жидкости

285. ПРИ ОЖОГАХ В КАЧЕСТВЕ ЭКСТРЕННОЙ ПРОФИЛАКТИКИ СТОЛБНЯКА ПРИВИТЫМ ДЕТАМ ВВОДЯТ

- 1)+ столбнячный анатоксин
- 2) иммуноглобулин человека противостолбнячный
- 3) сыворотку противостолбнячную
- 4) столбнячный анатоксин и сыворотку противостолбнячную

286. АВТОРОМ МЕТОДА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗМА К ВВЕДЕНИЮ ЧУЖЕРОДНОГО БЕЛКА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ Безредка
- 2) Нечипоренко
- 3) Пастер
- 4) Мечников

287. ПРОМЫВАНИЕ ЖЕЛУДКА РЕБЕНКУ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ НЕ ПОЗДНЕЕ __ ЧАСОВ С МОМЕНТА ПОПАДАНИЯ ЯДА

- 1)+ 2
- 2) 3
- 3) 4
- 4) 6

288. ТРЕТЬИМ ЭТАПОМ РАЗРАБОТКИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ РЕАБИЛИТАЦИИ ИЛИ АБИЛИТАЦИИ РЕБЕНКА-ИНВАЛИДА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ определение реабилитационного и абилитационного прогноза
- 2) проведение реабилитационно-абилитационной экспертной диагностики
- 3) определение реабилитационных или абилитационных мероприятий
- 4) оценка реабилитационного и абилитационного потенциала

289. ДЕТАМ ДО 10 ЛЕТ ГАЗОТВОДНАЯ ТРУБКА ПРИ ВВЕДЕНИИ ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА С ПОМОЩЬЮ КЛИЗМЫ ВВОДИТСЯ НА ГЛУБИНУ ____ СМ

- 1)+ 6-15
- 2) 15-30
- 3) 2-6
- 4) 15-20

290. ПЕРЕНОСЧИКОМ БОЛЕЗНИ ЛАЙМА ЯВЛЯЮТСЯ

- 1)+ клещи
- 2) вши
- 3) птицы
- 4) животные

291. ПРИ ГИПОГЛИКЕМИЧЕСКОЙ КОМЕ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ глюкоза
- 2) инсулин
- 3) хлорид натрия
- 4) хлорид калия

292. С ЦЕЛЬЮ СВОЕВРЕМЕННОГО ОБНАРУЖЕНИЯ ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ, В МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВОДИТСЯ

- 1)+ мониторинг медико-социального благополучия детей
- 2) санитарно-гигиеническое просвещение
- 3) реализация индивидуальных комплексных программ
- 4) разработка индивидуальных комплексных программ

293. ПРИ СУДОРОЖНОМ СИНДРОМЕ РЕБЕНКУ ВВОДЯТ

- 1)+ диазепам
- 2) преднизолон
- 3) глюкозу
- 4) натрия хлорид

294. БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ НА НАЛИЧИЕ ВОЗБУДИТЕЛЯ ДИФТЕРИИ ПРОВОДИТСЯ НЕ РАНЕЕ _____ДНЕЙ ПОСЛЕ ОТМЕНЫ АНТИБИОТИКОВ

- 1)+ 3
- 2) 1
- 3) 2
- 4) 7

295. ОДНОЙ ИЗ ЦЕЛЕЙ ОКАЗАНИЯ ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ ДЕТАМ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ уход, осуществляемый в целях улучшения качества жизни неизлечимо больных
- 2) проведение реабилитационных мероприятий
- 3) проведение радикальных оперативных вмешательств
- 4) подтверждение диагноза заболевания

296. ПРИ ГИПОТРОФИИ I СТЕПЕНИ ДЕФИЦИТ МАССЫ СОСТАВЛЯЕТ ____ ПРОЦЕНТОВ

- 1)+ 10-15
- 2) 5-7
- 3) 15-20
- 4) 21-30

297. МАТЕРИАЛ ИЗ РОТОГЛОТКИ И НОСА ДЛЯ БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ НА НАЛИЧИЕ ВОЗБУДИТЕЛЯ ДИФТЕРИИ БЕРЕТСЯ НАТОЩАК ИЛИ НЕ РАНЕЕ, ЧЕМ ЧЕРЕЗ _____ ПОСЛЕ ЕДЫ

- 1)+ 2 часа
- 2) 1 час
- 3) 3 часа
- 4) 4 часа

298. ТАМПОНЫ С ВЗЯТЫМ МАТЕРИАЛОМ ОТ ПАЦИЕНТА С ДИФТЕРИЕЙ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ДОСТАВЛЕНЫ В ЛАБОРАТОРИЮ НЕ ПОЗДНЕЕ ЧЕМ ЧЕРЕЗ _____ ЧАСА ПОСЛЕ ВЗЯТИЯ МАТЕРИАЛА

- 1)+ 3
- 2) 1
- 3) 2
- 4) 5

299. СПЕЦИФИЧЕСКИМ ОСЛОЖНЕНИЕМ БРЮШНОГО ТИФА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ кишечное кровотечение
- 2) инфекционно-токсический шок
- 3) судороги
- 4) гипертермия

300. ОПИСТОТОНУС, ТРИЗМ ЯВЛЯЮТСЯ ОДНИМ ИЗ ПРИЗНАКОВ

- 1)+ столбняка
- 2) бешенства
- 3) коклюша
- 4) дифтерии

301. ПРЕПАРАТАМИ ВЫБОРА В ЛЕЧЕНИИ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ ЯВЛЯЮТСЯ

- 1)+ ингибиторы протонного насоса
- 2) блокаторы H₂-гистаминовых рецепторов
- 3) препараты висмута трикалия дицитрата
- 4) антацидные препараты

302. МИНИМАЛЬНЫЙ СРОК ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ПИТАНИЯ ПРОДУКТА, ВЫЗЫВАЮЩЕГО У РЕБЕНКА ПИЩЕВУЮ АЛЛЕРГИЮ ЛЕГКОЙ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ, СОСТАВЛЯЕТ

- 1)+ 6 месяцев
- 2) 3 месяца
- 3) 3 недели
- 4) 6 недель

303. ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ВНУТРИКОЖНОЙ ИНЪЕКЦИИ ИГЛА РАСПОЛАГАЕТСЯ ПОД УГЛОМ _____ ГРАДУСОВ К ПОВЕРХНОСТИ ТЕЛА ПАЦИЕНТА

- 1)+ 10
- 2) 45
- 3) 90
- 4) 25

304. ПРИЗНАКОМ ГИПОТЕРМИЧЕСКОГО СИНДРОМА ЯВЛЯЕТСЯ СЛЕДУЮЩЕЕ ИЗМЕНЕНИЕ КОЖНЫХ ПОКРОВОВ

- 1)+ бледные с цианозом
- 2) желтушные
- 3) гиперемированные
- 4) синюшные

305. ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ ДЛЯ ПОСТАНОВКИ ОЧИСТИТЕЛЬНОЙ КЛИЗМЫ ПРИ СПАСТИЧЕСКИХ ЗАПОРАХ СОСТАВЛЯЕТ _____ ГРАДУСОВ ЦЕЛЬСИЯ

- 1)+ 37-38
- 2) 16-20
- 3) 23-25
- 4) 20-25

306. ОБИЛЬНАЯ РВОТА «ФОНТАНОМ», СНИЖЕНИЕ МАССЫ ТЕЛА У ГРУДНОГО РЕБЕНКА ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЗНАКОМ

- 1)+ пилоростеноза
- 2) пилороспазма
- 3) перекармливания
- 4) эзофагита

307. РАННИМ СИМПТОМОМ РЕТИНОБЛАСТОМЫ У ДЕТЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ косоглазие
- 2) повышение температуры
- 3) задержка роста
- 4) энофтальм

308. ЗНАМИВИР ПРИ ТЯЖЕЛЫХ ФОРМАХ ГРИППА У ДЕТЕЙ ПРИМЕНЯЕТСЯ С ВОЗРАСТА _____ ЛЕТ

- 1)+ 5
- 2) 12
- 3) 2
- 4) 3

309. СИМПТОМ ХВОСТЕКА У ДЕТЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ ПРОЯВЛЕНИЕМ

- 1)+ спазмофилии
- 2) рахита
- 3) фенилкетонурии
- 4) муковисцидоза

310. ПРИ АТОПИЧЕСКОМ ДЕРМАТИТЕ НА КОЖЕ ПОЯВЛЯЮТСЯ

- 1)+ пузырьки
- 2) волдыри
- 3) бугорки
- 4) язвы

311. В КАЧЕСТВЕ ПРОТИВОВИРУСНОЙ ТЕРАПИИ ДЕТЕЙ С COVID-19 В СЛУЧАЯХ ЗАБОЛЕВАНИЙ СРЕДНЕТЯЖЕЛОЙ И ЛЕГКОЙ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРЕПАРАТ

- 1)+ интерферон альфа
- 2) фавипиравир
- 3) молнупиравир
- 4) нирматрелвир+ритонавир

312. БОЛЕЗНЬ ДАУНА РАЗВИВАЕТСЯ ПРИ ТРИСОМИИ ПО _____ ПАРЕ ХРОМОСОМ

- 1)+ 21
- 2) 22
- 3) 20
- 4) 19

313. ОДНИМ ИЗ ХАРАКТЕРНЫХ ПРИЗНАКОВ ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНИ У ДЕТЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ дисфагия
- 2) нарушение стула
- 3) боли в эпигастральной области
- 4) боли в околопупочной области

314. В КЛАССИФИКАЦИИ TNM ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ БУКВА N ОЗНАЧАЕТ

- 1)+ поражение лимфатических узлов
- 2) размер опухоли
- 3) наличие метастазов
- 4) распространение опухоли

315. В ЭТИОЛОГИИ ОСТРОЙ РЕВМАТИЧЕСКОЙ ЛИХОРАДКИ ВЕДУЩАЯ РОЛЬ ПРИНАДЛЕЖИТ

- 1)+ стрептококку
- 2) энтерококку
- 3) стафилококку
- 4) пневмококку

316. К ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ПРИЧИНЕ ВОЗНИКНОВЕНИЕ КАМНЕЙ В МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЯХ У ДЕТЕЙ ОТНОСИТСЯ

- 1)+ аминокацидурия
- 2) фенилкетонурия
- 3) гомоцистинурия
- 4) муковисцидоз

317. ПРИ РАХИТЕ ДЕТАМ С ПОВЫШЕННОЙ ВОЗБУДИМОСТЬЮ ПОКАЗАНЫ _____ ВАННЫ

- 1)+ хвойные
- 2) радоновые
- 3) сероводородные
- 4) углекислые

318. ПРИ ЛЕЧЕНИИ АТОПИЧЕСКОГО ДЕРМАТИТА ДЕТАМ ДО С 4 МЕСЯЦЕВ ДО 1 ГОДА ПРИМЕНЯЮТ

- 1)+ метилпреднизолона ацепонат
- 2) клобетазон
- 3) бетаметазона дипропионат
- 4) мометазон

319. ПРИ САЛЬМОНЕЛЛЕЗЕ СТУЛ ИМЕЕТ ВИД

- 1)+ болотной тины
- 2) ректального плевка
- 3) рисового отвара
- 4) горохового пюре

320. ГЕНЕТИЧЕСКИ ОБУСЛОВЛЕННЫМ ЗАБОЛЕВАНИЕМ СЕРДЦА У ДЕТЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ гипертрофическая кардиомиопатия
- 2) инфекционный миокардит
- 3) инфекционный эндокардит
- 4) острая ревматическая лихорадка

321. ПАЛЛИАТИВНАЯ ПЕРВИЧНАЯ ДОВРАЧЕБНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ОКАЗЫВАЕТСЯ

- 1)+ медицинской сестрой
- 2) врачом-педиатром
- 3) врачом-онкологом
- 4) врачом-хирургом

322. ПРИ ЛЕЧЕНИИ ГИПОТРОФИИ II СТЕПЕНИ СУТОЧНЫЙ ОБЪЕМ ПИЩИ В ТЕЧЕНИЕ 7-10 ДНЕЙ СОСТАВЛЯЕТ _____ ДОЛЖНОГО ОБЪЕМА

- 1)+ две трети
- 2) одну треть
- 3) половину
- 4) на треть больше

323. В ЭТИОЛОГИИ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ ЖЕЛУДКА ВЕДУЩАЯ РОЛЬ ПРИНАДЛЕЖИТ

- 1)+ хеликобактерии
- 2) кишечной палочке
- 3) стафилококку
- 4) иерсинии

324. РЕБЕНКУ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ ПРОТИВОПОКАЗАНО ПРИМЕНЕНИЕ

- 1)+ ацетилсалициловой кислоты
- 2) парацетамола
- 3) сальбутамола
- 4) фенотерола

325. ПРИ АТОПИЧЕСКОМ ДЕРМАТИТЕ У ДЕТЕЙ ДО 1,5 ЛЕТ ТИПИЧНЫМ ЯВЛЯЕТСЯ ПОРАЖЕНИЕ КОЖИ

- 1)+ разгибательных поверхностей конечностей
- 2) живота
- 3) сгибательных поверхностей конечностей
- 4) спины

326. ВОЗБУДИТЕЛЕМ ИНФЕКЦИОННОГО МОНОНУКЛЕОЗА ЯВЛЯЕТСЯ ВИРУС

- 1)+ Эпштейна-Барр
- 2) Коксаки
- 3) Ласса
- 4) ЕСНО

327. ВЕДУЩЕЙ ПРИЧИНОЙ РАЗВИТИЯ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ У ДЕТЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ врожденный порок сердца
- 2) инфекционный миокардит
- 3) инфекционный эндокардит
- 4) гипертоническая болезнь

328. ОДНИМ ИЗ ПРОЯВЛЕНИЙ ТЯЖЕЛОГО ТЕЧЕНИЯ ГРИППА У ДЕТЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ синдром ДВС
- 2) острый ринит
- 3) острый фарингит
- 4) острый трахеит

329. ПРИ ГАЛАКТОЗЕМИИ У РЕБЕНКА ЧАСТО РАЗВИВАЕТСЯ ПОРАЖЕНИЕ ГЛАЗ В ВИДЕ

- 1)+ катаракты
- 2) глаукомы
- 3) экзофтальма
- 4) энофтальма

330. МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ (СТРУКТУРНЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ) ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПАЛЛИАТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ В СТАЦИОНАРНЫХ УСЛОВИЯХ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ хоспис
- 2) врачебная амбулатория
- 3) ФАП
- 4) детская поликлиника

331. УВЕЛИЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА МОЧИ НАЗЫВАЕТСЯ

- 1)+ полиурия
- 2) олигурия
- 3) поллакиурия
- 4) ишурия

332. ДЛЯ ДЕТЕЙ С МУКОВИСЦИДОЗОМ ХАРАКТЕРНО ПОВЫШЕНИЕ В ПОТЕ КОНЦЕНТРАЦИИ ИОНОВ

- 1)+ хлора
- 2) калия
- 3) кальция
- 4) фосфора

333. ПАЛЛИАТИВНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ОКАЗЫВАЕТСЯ ДЕТЯМ СО СЛЕДУЮЩИМ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

- 1)+ неоперабельные врожденные пороки развития
- 2) распространенные формы злокачественных новообразований в стадии клинико-лабораторной ремиссии
- 3) последствия травм с благоприятным прогнозом
- 4) соматические заболевания в стадии компенсации

334. ГРУБЫЙ КАШЕЛЬ, ОСИПЛОСТЬ ГОЛОСА ЯВЛЯЮТСЯ ПРИЗНАКОМ

- 1)+ ларинготрахеита
- 2) трахеита
- 3) бронхита
- 4) фарингита

generated at geetest.ru

Table of Contents

Тема 1. Общие вопросы профессиональной деятельности специалиста со средним медицинским образованием.	2
Тема 2. Участие в оказании медицинской помощи новорожденным.	9
Тема 3. Первичная доврачебная медико-санитарная помощь детям различного возраста.	23